



## Задача типа Коши для некоторых квазилинейных уравнений с производными Римана – Лиувилля и секториальным оператором

Федоров В. Е. , Авилевич А. С. ,  
Челябинский государственный университет,  
Россия, 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129  
[kar@csu.ru](mailto:kar@csu.ru), [avilovich\\_aas@bk.ru](mailto:avilovich_aas@bk.ru)

**Аннотация.** Исследованы вопросы разрешимости задачи типа Коши для квазилинейных уравнений, разрешенных относительно старшей дробной производной Римана – Лиувилля, оператор в линейной части при неизвестной функции в уравнении предполагается секториальным. При этом нелинейный оператор зависит от дробных производных младшего порядка с произвольной дробной частью. Получены теоремы о локальном и глобальном существовании единственного решения при условии локальной липшицевости и липшицевости нелинейного оператора соответственно в случае его непрерывности в норме графика секториального оператора. Задача типа Коши для квазилинейного уравнения сводится к интегро-дифференциальному уравнению в специально подобранном функциональном пространстве. Для доказательства существования единственного решения используется теорема Банаха о неподвижной точке сжимающего отображения в полном метрическом пространстве. Полученный абстрактный результат использован при исследовании вопросов существования и единственности решения одного класса начально-краевых задач для нелинейных уравнений в частных производных с многочленами от самосопряженного эллиптического оператора по пространственным переменным и с дробными производными по времени.



**Ключевые слова:** производная Римана – Лиувилля, задача типа Коши, квазилинейное уравнение, теорема о сжимающем отображении, локальная разрешимость, глобальная разрешимость

**Благодарности:** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-71-00100, <https://rscf.ru/project/24-71-00100/>

**Для цитирования:** Федоров В. Е., Авилевич А. С. 2024. Задача типа Коши для некоторых квазилинейных уравнений с производными Римана – Лиувилля и секториальным оператором. *Прикладная математика & Физика*, 56(4): 261–272. DOI 10.52575/2687-0959-2024-56-4-261-272

Original Research

## Cauchy Type Problem for Some Quasilinear Equations with Riemann – Liouville Derivatives and a Sectorial Operator

Vladimir E. Fedorov , Anna S. Avilovich ,  
Chelyabinsk State University,  
129 Brat'yev Kashirinykh St., Chelyabinsk 454001, Russia  
[kar@csu.ru](mailto:kar@csu.ru), [avilovich\\_aas@bk.ru](mailto:avilovich_aas@bk.ru)

**Abstract.** We studies the issues of solvability of the Cauchy type problem for quasi-linear equations solved with respect to the highest fractional Riemann – Liouville derivative, the operator in the linear part at an unknown function in the equation is assumed to be sectorial. In this case, the nonlinear operator depends on low-order fractional derivatives with an arbitrary fractional part. Theorems on the local and global existence of a unique solution are obtained under the condition of local Lipschitz continuity and Lipschitz continuity of a nonlinear operator, respectively, in the case of its continuity in the norm of the graph of the sectorial operator. The Cauchy type problem for a quasi-linear equation is reduced to an integro-differential equation in a specially selected functional space. To prove the existence of a unique solution, Banach Theorem on the fixed point of a compressive map in a complete metric space is used. The abstract result obtained is applied for the study of the existence and uniqueness of a solution of a class of initial boundary value problems for nonlinear partial differential equations with polynomials from a self-adjoint elliptic operator in spatial variables and with fractional derivatives in time.

**Keywords:** Riemann – Liouville Derivative, Cauchy Type Problem, Quasilinear Equation, Contraction Mapping Theorem, Local Solvability, Global Solvability

**Acknowledgements:** The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation No. 24-71-00100, <https://rscf.ru/project/24-71-00100/>

**For citation:** Fedorov V. E., Avilovich A. S. 2024. Cauchy Type Problem for Some Quasilinear Equations with Riemann – Liouville Derivatives and a Sectorial Operator. *Applied Mathematics & Physics*, 56(4): 261–272. (in Russian) DOI 10.52575/2687-0959-2024-56-4-261-272

**1. Введение.** Изучение функционально-аналитических аспектов интегро-дифференциальных уравнений, содержащих производные дробного порядка, в настоящее время является актуальной задачей в

связи со все более широким использованием таких уравнений в качестве математических моделей различных процессов [1, 2, 3]. Задачи для уравнений с различными дробными производными в банаховых пространствах исследовались в работах J. Prüss [4] (в форме интегральных уравнений), Э. Г. Бажлековой [5, 6], А. В. Глушака (см. [7, 8]) и др.

В работе [9] введен в рассмотрение класс операторов  $\mathcal{A}_\alpha$ , для которых уравнение  ${}^C D^\alpha z(t) = Az(t)$  в банаховом пространстве с дробной производной Герасимова – Капуто  ${}^C D^\alpha z$  и оператором  $A \in \mathcal{A}_\alpha$  имеет аналитическое в секторе разрешающее семейство операторов. В [10] получена теорема о существовании единственного решения неоднородного линейного уравнения, а в работах [11, 12, 13] исследованы вопросы однозначной разрешимости квазилинейных уравнений с оператором  $A \in \mathcal{A}_\alpha$  в линейной части и производной Герасимова – Капуто.

Существование единственного решения для линейного уравнения с дробной производной Римана – Лиувилля  $D^\alpha z$  и оператором  $A \in \mathcal{A}_\alpha$  доказано в [14, 15]. Соответствующие квазилинейные уравнения изучены в [16, 17], при этом нелинейный оператор предполагается зависящим только от производных порядков  $\alpha - m, \alpha - m + 1, \dots, \alpha_1$ , чтобы избежать появления дефекта задачи типа Коши, возникающего в случае нескольких дробных производных Римана – Лиувилля в уравнении (см. [18]). Локальная однозначная разрешимость задачи типа Коши для квазилинейных уравнений с несколькими производными Римана – Лиувилля произвольных порядков в линейной и нелинейной частях уравнения исследована в [19] с использованием непрерывности в норме графика нелинейного оператора и в [20] – с использованием его гельдеровости.

В данной работе исследуется квазилинейное дифференциальное уравнение в банаховом пространстве  $\mathcal{Z}$  вида

$$D^\alpha z(t) = Az(t) + B(t, D^{\alpha-e-m}z(t), D^{\alpha-e-m+1}z(t), \dots, D^{\alpha-1}z(t), D^{\gamma_1}z(t), D^{\gamma_2}z(t), \dots, D^{\gamma_q}z(t)), \quad t \in (0, T) \quad (1)$$

с линейным оператором  $A \in \mathcal{A}_\alpha$ , нелинейным отображением  $B$  и несколькими дробными производными Римана – Лиувилля  $D^\delta z$  при  $\delta > 0$  и дробными интегралами Римана – Лиувилля  $D^\delta z$  при  $\delta < 0$ . Здесь  $m - 1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_n < \alpha - 1$ ,  $n_i - 1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - m$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ . В предположении непрерывности нелинейного оператора  $B$  в норме графика оператора  $A$  будут исследованы вопросы локальной и глобальной разрешимости задачи типа Коши для уравнения (1). Заметим, что в используемом в [19] функциональном пространстве решений, включающем требование на старшую производную  $D^\alpha$ , нет возможности доказать теорему о глобальной разрешимости, поэтому в данной работе для этой цели введено в рассмотрение другое функциональное пространство  $C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ . Для этого пространства сначала получен ряд вспомогательных результатов. С их помощью посредством теорем о неподвижной точке сначала доказано локальное существование единственного решения задачи типа Коши для уравнения (1), а затем и однозначная глобальная разрешимость (т. е. на любом заданном отрезке) для этой задачи. Полученные результаты проиллюстрированы на примере одного класса начально-краевых задач.

**2. Предварительные сведения.** Пусть  $\mathcal{Z}$  – банахово пространство,  $\mathcal{L}(\mathcal{Z})$  – пространство линейных ограниченных операторов в  $\mathcal{Z}$  и  $Cl(\mathcal{Z})$  – множество линейных замкнутых плотно определённых в  $\mathcal{Z}$  операторов. Для  $h : (t_0, \infty) \rightarrow \mathcal{Z}$  определим интеграл Римана – Лиувилля порядка  $\beta > 0$

$$J^\beta h(t) := \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_{t_0}^t (t-s)^{\beta-1} h(s) ds, \quad t > 0,$$

$J^0$  будет означать тождественный оператор. Пусть  $m - 1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $D^m$  – обычная производная порядка  $m$ ,  $D^\alpha$  – дробная производная Римана – Лиувилля порядка  $\alpha$ , т. е.  $D^\alpha h(t) := D^m J^{m-\alpha} h(t)$ . При  $\beta < 0$  будем использовать обозначение  $D^\beta h(t) := J^{-\beta} h(t)$ .

Через  $D_A$  будем обозначать область определения оператора  $A \in Cl(\mathcal{Z})$ , снабженную его нормой графика  $\|\cdot\|_{D_A} = \|\cdot\|_{\mathcal{Z}} + \|A \cdot\|_{\mathcal{Z}}$ . В силу замкнутости оператора  $A$  множество  $D_A$  с нормой графика является банаховым пространством. Обозначим также  $\rho(A) := \{\mu \in \mathbb{C} : (\mu I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Z})\}$ ,  $R_\mu(A) := (\mu I - A)^{-1}$  при  $\mu \in \rho(A)$ .

**Определение 2.1.** Пусть  $\theta_0 \in (0, \pi/2)$ ,  $a_0 \geq 0$ . Через  $\mathcal{A}_\alpha(\theta_0, a_0)$  обозначим класс операторов  $A \in Cl(\mathcal{Z})$ , для которых выполняются следующие условия:

- (i) для любого  $\lambda \in S_{\theta_0, a_0} := \{\mu \in \mathbb{C} : |\arg(\mu - a_0)| < \theta, \mu \neq a_0\}$  выполняется включение  $\lambda^\alpha \in \rho(A)$ ;
- (ii) для любых  $\theta \in (\pi/2, \theta_0)$ ,  $a \geq a_0$  найдется такое  $K = K(\theta, a) > 0$ , что

$$\forall \lambda \in S_{\theta, a} \quad \|R_{\lambda^\alpha}(A)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq \frac{K(\theta, a)}{|\lambda|^\alpha}. \quad (2)$$

**Замечание 2.1.** В предыдущих работах использовалось неравенство

$$\forall \lambda \in S_{\theta, a} \quad \|R_{\lambda^\alpha}(A)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq \frac{K(\theta, a)}{|\lambda - a| |\lambda|^{\alpha-1}} \quad (3)$$

в условии (ii) определения 2.1. Покажем, что эти условия эквивалентны. Действительно, импликация из (2) в (3) очевидна. Обратно, в силу (3) при любых  $\theta \in (\pi/2, \theta_0)$ ,  $a > a_0$  имеем

$$\|R_{\lambda^\alpha}(A)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq \frac{K(\theta, \frac{a+a_0}{2})}{|\lambda - \frac{a+a_0}{2}| |\lambda|^{\alpha-1}},$$

так как  $\frac{a+a_0}{2} > a_0$ . При этом  $|\lambda - \frac{a+a_0}{2}|^{-1} \leq C(\theta, a)|\lambda|^{-1}$  для всех  $\lambda \in S_{\theta, a}$ , поэтому (2) выполняется с константой  $K(\theta, a) = C(\theta, a)K(\theta, \frac{a+a_0}{2})$ .

**Лемма 2.1.** [14]. Пусть  $\alpha > 0$ ,  $A \in \mathcal{A}_\alpha(\theta_0, a_0)$ ,  $\beta \in \mathbb{R}$ ,

$$Z_\beta(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \mu^{\alpha-1+\beta} R_{\mu^\alpha}(A) e^{\mu t} d\mu, \quad t \in \mathbb{R}_+,$$

$\Gamma = \Gamma_+ \cup \Gamma_- \cup \Gamma_0$ ,  $\Gamma_\pm = \{\mu \in \mathbb{C} : \mu = a + r e^{\pm i\theta}, r \in (\delta, \infty)\}$ ,  $\Gamma_0 = \{\mu \in \mathbb{C} : \mu = a + \delta e^{i\varphi}, \varphi \in (-\theta, \theta)\}$  при  $\delta > 0$ ,  $a > a_0$ ,  $\theta \in (\pi/2, \theta_0)$ . Тогда  $Z_\beta$  допускает аналитическое продолжение в сектор  $\Sigma_{\theta_0-\pi/2} := \{\tau \in \mathbb{C} : |\arg \tau| < \theta_0 - \pi/2, \tau \neq 0\}$  и при всех  $a > a_0$ ,  $\theta \in (\pi/2, \theta_0)$  существует такое  $C_\beta = C_\beta(\theta, a)$ , что для всех  $\tau \in \Sigma_{\theta_0-\pi/2}$

$$\|Z_\beta(\tau)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq C_\beta(\theta, a) e^{a \operatorname{Re} \tau} (|\tau|^{-1} + a)^\beta, \quad \beta \geq 0,$$

$$\|Z_\beta(\tau)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z})} \leq C_\beta(\theta, a) e^{a \operatorname{Re} \tau} |\tau|^{-\beta}, \quad \beta < 0.$$

Обозначим

$$\mathcal{A}_\alpha := \bigcup_{\substack{\theta_0 \in (\pi/2, \pi] \\ a_0 \geq 0}} \mathcal{A}_\alpha(\theta_0, a_0)$$

и сформулируем два варианта теоремы об однозначной разрешимости задачи типа Коши для неоднородного линейного уравнения, которые были доказаны в [14] и [15].

**Теорема 2.1.** [14]. Пусть  $\alpha > 0$ ,  $A \in \mathcal{A}_\alpha$ ,  $f \in C([0, T]; D_A)$ . Тогда при любых начальных данных  $z_0, z_1, \dots, z_{m-1} \in D_A$  функция

$$z(t) = \sum_{k=0}^{m-1} Z_{m-\alpha-k}(t) z_k + \int_0^t Z_{1-\alpha}(t-s) f(s) ds \tag{4}$$

является единственным решением задачи типа Коши

$$D^{\alpha-m+k} z(0) = z_k, \quad k = 0, \dots, m-1, \tag{5}$$

для уравнения

$$D^\alpha z(t) = Az(t) + f(t), \quad t \in (0, T). \tag{6}$$

**Теорема 2.2.** [15]. Пусть  $\alpha > 0$ ,  $A \in \mathcal{A}_\alpha$ ,  $f \in C^Y([0, T]; \mathcal{Z})$ ,  $\gamma \in (0, 1]$ . Тогда при любых  $z_0, z_1, \dots, z_{m-1} \in D_A$  функция (4) является единственным решением задачи типа Коши (5), (6).

**3. Локальная разрешимость.** Пусть  $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ . Рассмотрим квазилинейное уравнение

$$D^\alpha z(t) = Az(t) + B(t, D^{\alpha-m-\varrho} z(t), D^{\alpha-m-\varrho+1} z(t), \dots, D^{\alpha-1} z(t), D^{\gamma_1} z(t), \dots, D^{\gamma_q} z(t)), \tag{7}$$

где  $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\varrho \in \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_q < \alpha-1$ ,  $n_i-1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - m$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ . Некоторые  $\gamma_i$  могут быть отрицательными. Пусть  $i_0 := \min\{i \in \{1, 2, \dots, q\} : \gamma_i > 0\}$ , если  $\{i \in \{1, 2, \dots, q\} : \gamma_i > 0\}$  не пусто, при  $\gamma_q \leq 0$  будем считать, что  $i_0 := q+1$ .

Определим  $\underline{\gamma} := \max\{\gamma_i : \gamma_i - m_i < \alpha - m, i = 1, 2, \dots, q\}$ ,  $\underline{n} := \lceil \underline{\gamma} \rceil$ ,  $\bar{\gamma} := \max\{\gamma_i : \gamma_i - m_i > \alpha - m, i = 1, 2, \dots, q\}$ ,  $\bar{n} := \lceil \bar{\gamma} \rceil$ ,  $n^* := \max\{\underline{n} - 1, \bar{n}\}$ . В работе [18]  $n^*$  называется дефектом задачи типа Коши.

Для исследования уравнения (7) потребуется существование конечных пределов  $\lim_{t \rightarrow t_0} D^{\gamma_i} z(t) := D^{\gamma_i} z(t_0)$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ , поэтому определим  $\mu^* := \max\{n^* + 1, 0\}$ . В итоге, с учетом следствий 1-4 [18] для уравнения (7) будем рассматривать задачу

$$D^{\alpha-m+k} z(t_0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \mu^* - 1, \quad D^{\alpha-m+k} z(t_0) = z_k, \quad k = \mu^*, \mu^* + 1, \dots, m-1. \tag{8}$$

Пусть  $Z$  — открытое подмножество в  $\mathbb{R} \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q}$ , отображение  $B : Z \rightarrow \mathcal{Z}$  локально липшицево в норме  $D_A$ , т. е. для каждого  $(t, z_1, z_2, \dots, z_{m+\varrho+q}) \in Z$  существуют окрестность  $V \subset Z$ ,  $l > 0$ , такие, что для всех  $(t, x_1, x_2, \dots, x_{m+\varrho+q}), (t, y_1, y_2, \dots, y_{m+\varrho+q}) \in V$

$$\|B(t, x_1, x_2, \dots, x_{m+\varrho+q}) - B(t, y_1, y_2, \dots, y_{m+\varrho+q})\|_{D_A} \leq l \sum_{k=1}^{m+\varrho+q} \|x_k - y_k\|_{\mathcal{Z}}. \tag{9}$$

Решением задачи типа Коши (8) для уравнения (7) на отрезке  $[t_0, t_1]$  будем называть функцию  $z \in C((t_0, t_1]; D_A)$ , такую, что  $J^{m-\alpha}z \in C^m((t_0, t_1]; \mathcal{Z}) \cap C^{m-1}([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ ,  $D^{Y_i}z \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ , выполнены условия (8), включение

$$(t, D^{\alpha-m-\varrho}z(t), D^{\alpha-m-\varrho+1}z(t), \dots, D^{\alpha-1}z(t), D^{Y_1}z(t), D^{Y_2}z(t), \dots, D^{Y_q}z(t)) \in \mathcal{Z}$$

при  $t \in [t_0, t_1]$  и равенство (7) при  $t \in (t_0, t_1]$ .

**Лемма 3.1.** Пусть  $m - 1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma \in (0, 1]$ . Тогда линейное пространство

$$C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z}) := \{x \in C((t_0, t_1]; \mathcal{Z}) : (t - t_0)^{m-\alpha}x(t) \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z}), J^{m-\alpha}x \in C^{m-1}([t_0, t_1]; \mathcal{Z})\}$$

с нормой  $\|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} := \|J^{m-\alpha}x\|_{C^{m-1}([t_0, t_1]; \mathcal{Z})} + \|(t - t_0)^{m-\alpha}x(t)\|_{C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})}$  является банаховым.

**Доказательство.** Аксиомы нормы могут быть проверены непосредственно. Пусть последовательность  $\{x_k\}$  фундаментальна в  $C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ , тогда существуют пределы  $y := \lim_{k \rightarrow \infty} (t - t_0)^{m-\alpha}x_k \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ ,  $y_1(t) := \lim_{k \rightarrow \infty} J^{m-\alpha}x_k \in C^{m-1}([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ . Положим при  $t \in (t_0, t_1]$   $x(t) := (t - t_0)^{\alpha-m}y(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k(t)$  в пространстве  $\mathcal{Z}$ . Ограниченность последовательности  $\{x_k\}$  в  $C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$  влечет неравенство  $\|x_k(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq C(t - t_0)^{\alpha-m}$  при  $t \in (t_0, t_1]$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , тогда

$$\left\| \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{m-\alpha-1}}{\Gamma(m-\alpha)} x_k(s) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq C \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{m-\alpha-1}}{\Gamma(m-\alpha)} (s-t_0)^{\alpha-m} ds = C\Gamma(\alpha - m + 1).$$

По теореме Лебега существует  $J^{m-\alpha}x = J^{m-\alpha} \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} J^{m-\alpha}x_k = y_1 \in C^{m-1}([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ .

**Лемма 3.2.** Пусть  $m - 1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ . Тогда при любом  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k < m - 1$  существует такое  $C > 0$ , что при всех  $x \in C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ ,  $s, t \in [t_0, t_1]$

$$\|D^{\alpha-m+k}x(s) - D^{\alpha-m+k}x(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq C\|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})}|s - t|.$$

**Доказательство.** При  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k < -1$ ,  $s, t \in [t_0, t_1]$ ,  $s < t$  в силу определения дробного интеграла Римана – Лиувилля и теоремы Лагранжа

$$\begin{aligned} D^{\alpha-m+k}x(s) - D^{\alpha-m+k}x(t) &= (s-t)D^{\alpha-m+k+1}x(\xi) = (s-t)J^{-k-1}J^{m-\alpha}x(\xi) = \\ &= (s-t) \int_{t_0}^{\xi} \frac{(\xi-\tau)^{-k-2}}{\Gamma(-k-1)} J^{m-\alpha}x(\tau) d\tau \end{aligned}$$

при некотором  $\xi$ , расположенном между точками  $s$  и  $t$ . Поэтому

$$\|D^{\alpha-m+k}x(s) - D^{\alpha-m+k}x(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq (s-t)\|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} \frac{(t_1 - t_0)^{-k-1}}{\Gamma(-k)}.$$

Для  $k \in \{-1, 0, \dots, m-2\}$

$$\|D^{\alpha-m+k}x(s) - D^{\alpha-m+k}x(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq (s-t) \max_{\tau \in [s, t]} \|D^{\alpha-m+k+1}x(\tau)\|_{\mathcal{Z}} \leq \|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} (s-t).$$

**Замечание 3.1.** В условиях леммы 3.2 легко получить, что при любом  $x \in C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $k < 0$

$$\|D^{\alpha-m+k}x\|_{C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})} \leq \frac{(t_1 - t_0)^{-k}}{\Gamma(1-k)} \|J^{m-\alpha}x\|_{C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})}.$$

**Лемма 3.3.** Пусть  $m - 1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $x \in C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ ,  $n - 1 < \beta \leq n \in \mathbb{Z}$ ,  $\beta < \alpha - 1$ ,  $\alpha - m \neq \beta - n$ . Тогда  $D^\beta x \in C((t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ .

**Доказательство.** Если  $\beta - n < \alpha - m$ , то  $n \leq m - 1$ , при  $x \in C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$   $J^{n-\beta}x = J^{n-\beta+\alpha-m}J^{m-\alpha}x$ . Поэтому при  $k = 0, 1, \dots, m - 1$

$$\begin{aligned} D^k J^{n-\beta+\alpha-m} J^{m-\alpha} x(t) &= \sum_{l=0}^{k-1} \frac{(t-t_0)^{n-\beta+\alpha-m-k+l} D^{\alpha-m+l} x(t_0)}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m-k+l+1)} + \\ &+ \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{n-\beta+\alpha-m-1}}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m)} D^{\alpha-m+k} x(s) ds, \end{aligned} \quad (10)$$

$$\left\| \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{n-\beta+\alpha-m-1}}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m)} D^{\alpha-m+k} x(s) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \frac{\|x\|_{C_{\alpha}(t_0, t_1; \mathcal{Z})} (t-t_0)^{n-\beta+\alpha-m}}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m+1)}.$$

В случае  $\beta-n > \alpha-m$  имеем  $n \leq m-2$  согласно условию  $\beta < \alpha-1$ . Следовательно, для  $k = 0, 1, \dots, m-2$

$$\begin{aligned} D^k J^{n-\beta} x(t) &= D^k J^{n-\beta} D^{m-\alpha} J^{m-\alpha} x(t) = D^k J^{n-\beta} D^1 J^{\alpha-m+1} J^{m-\alpha} x(t) = \\ &= D^k J^{n-\beta} \left( \frac{(t-t_0)^{\alpha-m}}{\Gamma(\alpha-m+1)} J^{m-\alpha} x(t_0) + J^{\alpha-m+1} D^{\alpha-m+1} x(t) \right) = \\ &= \frac{(t-t_0)^{n-\beta+\alpha-m-k} J^{m-\alpha} x(t_0)}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m-k+1)} + D^k J^{n-\beta+\alpha-m+1} D^1 J^{m-\alpha} x(t) = \\ &= \sum_{l=0}^k \frac{(t-t_0)^{n-\beta+\alpha-m-k+l} D^{\alpha-m+l} x(t_0)}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m-k+l+1)} + \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{n-\beta+\alpha-m}}{\Gamma(n-\beta+\alpha-m+1)} D^{\alpha-m+k+1} x(s) ds. \end{aligned} \quad (11)$$

При получении последнего равенства используется (10) и сдвиг нумерации в сумме. Как и в предыдущем абзаце, получим неравенства для интегралов при значениях  $k = 0, \dots, m-2$ , поэтому  $D^{\beta} x \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ .

Введем в рассмотрение также пространство  $C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z}) := \{x \in C_{\alpha}(t_0, t_1; \mathcal{Z}) : D^{\alpha-m+k} x(t_0) = 0, k = 0, 1, \dots, \mu^* - 1\}$ .

**Замечание 3.2.** По построению  $\mu^*$  для  $x \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$  имеем равенства (см. [18])  $D^{\gamma_i - n_i + k} x(t_0) = 0$ ,  $k = 0, 1, \dots, n_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ .

**Лемма 3.4.** Пусть  $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_q < \alpha-1$ . Тогда  $D^{\gamma_i} x \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ , и существует такое  $C > 0$ , что для всех  $x \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$

$$\|D^{\gamma_i} x\|_{C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})} \leq C \|x\|_{C_{\alpha}(t_0, t_1; \mathcal{Z})}. \quad (12)$$

**Доказательство.** Из замечания 3.2 и леммы 3.3 следует, что для  $x \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$  выполняются включения  $D^{\gamma_i} x \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ . Из (10) и равенств  $D^{\alpha-m+k} x(t_0) = 0$ ,  $k = 0, 1, \dots, n_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ , получаем при  $\gamma_i - n_i < \alpha - m$

$$D^{\gamma_i} x(t) = \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m)} D^{n_i} J^{m-\alpha} x(s) ds, \quad (13)$$

а при  $\gamma_i - n_i > \alpha - m$  в соответствии с (11) имеем

$$D^{\gamma_i} x(t) = \int_{t_0}^t \frac{(t-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1)} D^{n_i+1} J^{m-\alpha} x(s) ds.$$

В обоих случаях приходим к (12). Лемма доказана.

Возьмем в качестве  $\underline{\gamma} \in (0, 1)$  минимальное из положительных чисел  $n_i - \gamma_i + \alpha - m$  и  $\bar{\gamma} \in (0, 1)$  — минимальное из чисел  $n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1$ , таких, что  $n_i - \gamma_i + \alpha - m < 0$ . Определим  $\gamma^* := \min\{\underline{\gamma}, \bar{\gamma}\} \in (0, 1)$ .

**Замечание 3.3.** Из доказательства леммы 3.4 следует, что в ее условиях существует  $C > 0$ , такое, что при всех  $x \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$

$$\|D^{\gamma_i} x\|_{C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})} \leq C \|J^{m-\alpha} x\|_{C^{m-1}([t_0, t_1]; \mathcal{Z})} (t-t_0)^{\gamma^*}.$$

**Лемма 3.5.** Пусть  $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $x \in C_{\alpha; \mu_0^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ ,  $\gamma_q < \alpha-1$ . Тогда существует  $C > 0$ , такое, что для каждого  $i = 1, 2, \dots, q$  при всех  $s, t \in [t_0, t_1]$

$$\|D^{\gamma_i} x(s) - D^{\gamma_i} x(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq C \|x\|_{C_{\alpha}(t_0, t_1; \mathcal{Z})} |s-t|^{\gamma^*}.$$

**Доказательство.** При  $s, t \in [t_0, t_1]$ ,  $s < t$ ,  $\gamma_i - n_i < \alpha - m$  в силу (13) имеем

$$\begin{aligned} D^{\gamma_i} x(t) - D^{\gamma_i} x(s) &= \int_s^t \frac{(t-\tau)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m)} D^{n_i} J^{m-\alpha} x(\tau) d\tau + \\ &+ \int_{t_0}^s \frac{(t-\tau)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1} - (s-\tau)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m)} D^{n_i} J^{m-\alpha} x(\tau) d\tau, \end{aligned}$$

отсюда

$$\begin{aligned} \|D^{\gamma_i} x(t) - D^{\gamma_i} x(s)\|_{\mathcal{Z}} &\leq \frac{\|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} (t-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1)} + \\ &+ \|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} \left| \int_{t_0}^s \int_s^t \frac{(u-\tau)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 2}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1)} du d\tau \right| = \frac{\|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} (t-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1)} + \\ &+ \|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} \left| \int_s^t \frac{(u-t_0)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1} - (u-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m)} du \right| \leq \\ &\leq \|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} \left( \frac{(t-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1)} + 2 \int_s^t \frac{(u-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m - 1}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m)} du \right) \leq \\ &\leq \frac{3\|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})}}{\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1)} (t-s)^{n_i - \gamma_i + \alpha - m} = C_i \|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} (t-s)^{\delta_i}, \quad \delta_i = n_i - \gamma_i + \alpha - m \in (0, 1). \end{aligned}$$

Аналогично при  $\gamma_i - n_i > \alpha - m$  получим  $\|D^{\gamma_i} x(t) - D^{\gamma_i} x(s)\|_{\mathcal{Z}} \leq C_i \|x\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})} (t-s)^{\delta_i}$  с  $\delta_i = n_i - \gamma_i + \alpha - m + 1 \in (0, 1)$ ,  $C_i = 3/\Gamma(n_i - \gamma_i + \alpha - m + 2) > 0$ . Взяв максимальное из  $C_i$  и минимальное из  $\delta_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ , завершим доказательство.

**Замечание 3.4.** Функция, удовлетворяющая условиям задачи типа Коши (8), с точностью до  $o(t-t_0)^{\alpha-1}$  при  $t \rightarrow t_0+$  ведет себя как функция

$$\tilde{z}(t) = \frac{(t-t_0)^{\alpha-m+\mu^*} z_{\mu^*}}{\Gamma(\alpha-m+\mu^*+1)} + \frac{(t-t_0)^{\alpha-m+\mu^*+1} z_{\mu^*+1}}{\Gamma(\alpha-m+\mu^*+2)} + \dots + \frac{(t-t_0)^{\alpha-1} z_{m-1}}{\Gamma(\alpha)}.$$

По построению  $\mu^* D^{\alpha-m-\varrho} \tilde{z}(t_0) = D^{\alpha-m-\varrho+1} \tilde{z}(t_0) = \dots = D^{\alpha-m+\mu^*-1} \tilde{z}(t_0) = 0$ ,  $D^{\gamma_1} \tilde{z}(t_0) = D^{\gamma_2} \tilde{z}(t_0) = \dots = D^{\gamma_q} \tilde{z}(t_0) = 0$ . Поэтому при  $t = t_0$  аргумент нелинейного оператора в уравнении (7) имеет вид  $(t_0, 0, 0, \dots, 0, z_{\mu^*}, z_{\mu^*+1}, \dots, z_{m-1}, 0, 0, \dots, 0)$ .

**Лемма 3.6.** Пусть  $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_q < \alpha-1$ ,  $n_i-1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - m$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ ,  $A \in \mathcal{A}_\alpha$ ,  $z_k \in D_A$ ,  $k = \mu^*, \mu^*+1, \dots, m-1$ ,  $Z$  открыто в  $\mathbb{R} \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q}$ ,  $(t_0, 0, 0, \dots, 0, z_{\mu^*}, z_{\mu^*+1}, \dots, z_{m-1}, 0, 0, \dots, 0) \in Z$ ,  $B \in C(Z; D_A)$ . Тогда функция  $z \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$  является решением задачи (7), (8) на отрезке  $[t_0, t_1]$  при некотором  $t_1 > t_0$  в том и только в том случае, когда при  $t \in [t_0, t_1]$

$$z(t) = \sum_{k=\mu^*}^{m-1} Z_{m-\alpha-k}(t-t_0) z_k + \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s) B^z(s) ds, \quad (14)$$

где  $B^z(s) = B(s, D^{\alpha-m-\varrho} z(s), D^{\alpha-m-\varrho+1} z(s), \dots, D^{\alpha-1} z(s), D^{\gamma_1} z(s), \dots, D^{\gamma_q} z(s)) ds$ .

**Доказательство.** Если  $z \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ , то в силу леммы 3.5 и с учетом условий на оператор  $B$  отображение,  $t \rightarrow B^z(t)$  непрерывно действует из  $[t_0, t_1]$  в  $D_A$ , а значит, удовлетворяет условиям теоремы 2.1. В силу этой теоремы  $z$  является решением задачи (7), (8) на отрезке  $[t_0, t_1]$  тогда и только тогда, когда на нем выполняется равенство (14).

**Теорема 3.1.** Пусть  $m-1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_q < \alpha-1$ ,  $n_i-1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - m$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ ,  $A \in \mathcal{A}_\alpha$ ,  $z_k \in D_A$ ,  $k = \mu^*, \mu^*+1, \dots, m-1$ ,  $Z$  открыто в  $\mathbb{R} \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q}$ ,  $(t_0, 0, 0, \dots, 0, z_{\mu^*}, z_{\mu^*+1}, \dots, z_{m-1}, 0, 0, \dots, 0) \in Z$ , отображение  $B \in C(Z; D_A)$  локально липшицево в норме  $D_A$ . Тогда существует такое  $t_1 > t_0$ , что задача (7), (8) имеет единственное решение на  $[t_0, t_1]$ .

**Доказательство.** Возьмём  $t_1 > t_0$ ,  $\varepsilon > 0$ , такие, что в окрестности

$$\begin{aligned} V := \{ &(t, y_1, y_2, \dots, y_{m+\varrho+q}) \in \mathbb{R} \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q} : t \in [t_0, t_1], \|y_k\| \leq \varepsilon, \\ &k = 1, 2, \dots, \varrho + \mu^*, \varrho + m + 1, \varrho + m + 2, \dots, \varrho + m + q, \\ &\|y_j - z_{j-\varrho-1}\| \leq \varepsilon, j = \varrho + \mu^* + 1, \varrho + \mu^* + 2, \dots, \varrho + m \} \end{aligned}$$

неравенство (9) выполняется при некотором  $l > 0$ .

Рассмотрим множество

$$M_{t_1} := \{y \in C_{\alpha; \mu^*}(t_0, t_1; \mathcal{Z}) : \|D^{\alpha-m+k} y(t)\|_{\mathcal{Z}} \leq \varepsilon, k = -\varrho, -\varrho+1, \dots, \mu^*-1,$$

$$\|D^{\alpha-m+k} y(t) - z_k\|_{\mathcal{Z}} \leq \varepsilon, k = \mu^*, \mu^*+1, \dots, m-1, t \in [t_0, t_1]\},$$

которое в силу леммы 3.1 является полным метрическим пространством с метрикой, задаваемой как норма разности в  $C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})$ . Определим в  $\mathcal{M}_{t_1}$  оператор

$$G(y)(t) := \sum_{k=\mu^*}^{m-1} Z_{m-\alpha-k}(t-t_0)z_k + \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s)B^y(s) ds$$

при  $t \in (t_0, t_1]$ . Имеем для  $y \in \mathcal{M}_{t_1}$  в силу леммы 2.1  $(t-t_0)^{m-\alpha}G(y)(t) \in C([t_0, t_1]; \mathcal{Z})$ . С учетом доказательства предыдущей леммы и теоремы 2.1 получим, что  $G(y) \in \mathcal{M}_{t_1}$  для любого  $y \in \mathcal{M}_{t_1}$  при  $t_1 > t_0$ , достаточно близком к  $t_0$ .

В [14, 15] показано, что

$$D^{\alpha-m+k} \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s)B^y(s) ds = \int_{t_0}^t Z_{k+1-m}(t-s)B^y(s) ds.$$

Поэтому для  $x, y \in \mathcal{M}_{t_1}$  в силу лемм 2.1 и 3.4 при  $k = 0, 1 + 1, \dots, m - 1$ ,

$$\begin{aligned} \|D^{\alpha-m+k}G(x)(t) - D^{\alpha-m+k}G(y)(t)\|_{\mathcal{Z}} &= \left\| \int_{t_0}^t Z_{k+1-m}(t-s)(B^x(s) - B^y(s)) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ &\leq lC_{k+1-m}(t-t_0)e^{\alpha(t-t_0)} \left( \sum_{j=-\varrho}^{m-1} \max_{t \in [t_0, t_1]} \|D^{\alpha-m+j}x(t) - D^{\alpha-m+j}y(t)\|_{\mathcal{Z}} + \right. \\ &\quad \left. + \max_{t \in [t_0, t_1]} \sum_{i=1}^q \|D^{y_i}x(t) - D^{y_i}y(t)\|_{\mathcal{Z}} \right) \leq c_1(t_1 - t_0)\|x - y\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})}, \end{aligned}$$

где  $c_1 > 0$  не зависит от  $x, y$ . Кроме того,

$$\begin{aligned} \|(t-t_0)^{m-\alpha}(G(x)(t) - G(y)(t))\|_{\mathcal{Z}} &= \left\| (t-t_0)^{m-\alpha} \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s)(B^x(s) - B^y(s)) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ &\leq \left( \sum_{j=-\varrho}^{m-1} \max_{t \in [t_0, t_1]} \|D^{\alpha-m+j}x(t) - D^{\alpha-m+j}y(t)\|_{\mathcal{Z}} + \max_{t \in [t_0, t_1]} \sum_{i=1}^q \|D^{y_i}x(t) - D^{y_i}y(t)\|_{\mathcal{Z}} \right) \times \\ &\quad \times lC_{1-\alpha}e^{\alpha(t_1-t_0)}(t_1 - t_0)^m \leq c_1(t_1 - t_0)^m\|x - y\|_{C_\alpha(t_0, t_1; \mathcal{Z})}. \end{aligned}$$

Таким образом, оператор  $G$  отображает метрическое пространство  $\mathcal{M}_{t_1}$  в себя и является оператором сжатия на нем, если  $t_1 - t_0$  достаточно мало. Поэтому существует его единственная неподвижная точка  $z \in \mathcal{M}_{t_1}$ . Согласно лемме 3.6  $z$  — решение задачи (7), (8) на отрезке  $[t_0, t_1]$ .

Единственность решения следует из единственности неподвижной точки в силу леммы 3.6.

**4. Глобальная разрешимость.** Обозначим  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{m+\varrho+q}) \in \mathcal{Z}^{m+\varrho+q}$ . Отображение  $B : [t_0, T] \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q} \rightarrow \mathcal{Z}$  называется липшицевым по  $\bar{x}$ , если существует такое  $L > 0$ , что для всех  $(t, \bar{x}), (t, \bar{y}) \in [t_0, T] \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q}$  выполняется

$$\|B(t, \bar{x}) - B(t, \bar{y})\|_{\mathcal{Z}} \leq L \sum_{k=1}^{m+\varrho+q} \|x_k - y_k\|_{\mathcal{Z}}.$$

**Теорема 4.1.** Пусть  $m - 1 < \alpha \leq m \in \mathbb{N}$ ,  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_q < \alpha - 1$ ,  $n_i - 1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - m$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ ,  $A \in \mathcal{A}_\alpha$ ,  $z_k \in D_A$ ,  $k = \mu^*, \mu^* + 1, \dots, m - 1$ , отображение  $B \in C([t_0, T] \times \mathcal{Z}^{m+\varrho+q}; D_A)$  липшицево по  $\bar{x}$  в норме  $D_A$ . Тогда задача (7), (8) имеет единственное решение на  $[t_0, T]$ .

**Доказательство.** По лемме 3.6 достаточно показать, что уравнение (7) имеет единственное решение в банаховом пространстве

$$C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z}) := \{x \in C_\alpha(t_0, T; \mathcal{Z}) : D^{\alpha-m+k}x(t_0) = 0, k = 0, 1, \dots, \mu^* - 1\}.$$

Определим для  $y \in C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$  оператор

$$G(y)(t) := \sum_{k=\mu^*}^{m-1} Z_{m-\alpha-k}(t-t_0)z_k + \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s)B^y(s) ds, \quad t \in [t_0, T].$$

Как при доказательстве теоремы 3.1 получаем, что  $G(y) \in C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$  для любой функции  $y \in C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$ . При этом используется тот факт, что

$$D_t^{\alpha-m+k} \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s) B^z(s) ds \Big|_{t=t_0} = \int_{t_0}^t Z_{k+1-m}(t-s) B^z(s) ds \Big|_{t=t_0} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, m-1.$$

Обозначим  $j$ -ю степень оператора  $G$  как  $G^j$ ,  $T_1 := \max\{1, T - t_0\}$ . Для  $x, y \in C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$  в силу леммы 2.1 при  $k = 0, 1, \dots, m-1$ ,

$$\begin{aligned} \|D^{\alpha-m+k} G(x)(t) - D^{\alpha-m+k} G(y)(t)\|_{\mathcal{Z}} &= \left\| \int_{t_0}^t Z_{k+1-m}(t-s) (B^x(s) - B^y(s)) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ &\leq C_{k+1-m} e^{a(T-t_0)} \int_{t_0}^t (t-s)^{m-k-1} L \sum_{j=-\varrho}^{m-1} \|D^{\alpha-m+j} x(s) - D^{\alpha-m+j} y(s)\|_{\mathcal{Z}} ds + \\ &+ C_{k+1-m} e^{a(T-t_0)} \int_{t_0}^t (t-s)^{m-k-1} L \sum_{i=1}^q \|D^{y_i} x(s) - D^{y_i} y(s)\|_{\mathcal{Z}} ds \leq \\ &\leq LC_{k+1-m} T_1^{m-k-1} e^{a(T-t_0)} (t-t_0) \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq c_1 (t-t_0) \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})}, \end{aligned}$$

где  $c_1 := Le^{a(T-t_0)} \max\{\alpha^{-1} C_{1-\alpha} T_1^{m-1}, C_{k+1-m} T_1^{m-k-1} : k = 0, 1, \dots, m-1\}$ . Кроме того,

$$\begin{aligned} \|(t-t_0)^{m-\alpha} (G(x)(t) - G(y)(t))\|_{\mathcal{Z}} &= \left\| (t-t_0)^{m-\alpha} \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s) (B^x(s) - B^y(s)) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ &\leq \frac{LC_{1-\alpha}}{\alpha} e^{a(T-t_0)} (t-t_0)^m \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, T; \mathcal{Z})} \leq c_1 (t-t_0) \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})}. \end{aligned}$$

Таким образом, верна следующая оценка

$$\|G(x) - G(y)\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq (m+1)c_1 (t-t_0) \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})}.$$

Для  $k = 0, 1, \dots, m-1$  имеем

$$\begin{aligned} \|D^{\alpha-m+k} G^2(x)(t) - D^{\alpha-m+k} G^2(y)(t)\|_{\mathcal{Z}} &= \left\| \int_{t_0}^t Z_{k+1-m}(t-s) (B^{G(x)}(s) - B^{G(y)}(s)) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ &\leq LC_{k+1-m} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-k-1} \int_{t_0}^t \|G(x) - G(y)\|_{C_{\alpha}(t_0, s; \mathcal{Z})} ds \leq \\ &\leq (m+1)c_1^2 \int_{t_0}^t (s-t_0) \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, s; \mathcal{Z})} ds \leq \frac{(m+1)c_1^2}{2} (t-t_0)^2 \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\ \|(t-t_0)^{m-\alpha} (G^2(x)(t) - G^2(y)(t))\|_{\mathcal{Z}} &= \left\| (t-t_0)^{m-\alpha} \int_{t_0}^t Z_{1-\alpha}(t-s) (B^{G(x)}(s) - B^{G(y)}(s)) ds \right\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ &\leq LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-\alpha} \int_{t_0}^t (t-s)^{\alpha-1} \|G(x) - G(y)\|_{C_{\alpha}(t_0, s; \mathcal{Z})} ds \leq \\ &\leq (m+1)c_1 LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-\alpha} \int_{t_0}^t (t-s)^{\alpha-1} (s-t_0) ds \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})} = \\ &= (m+1)c_1 LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-\alpha} \int_0^{t-t_0} \tau^{\alpha-1} (t-t_0-\tau) d\tau \|x-y\|_{C_{\alpha}(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&\leq (m+1)c_1 LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-1} (t-t_0)^2 \mathcal{B}(\alpha, 2) \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \\
&\leq \frac{(m+1)c_1 LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-1}}{\alpha} (t-t_0)^2 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \\
&\leq \frac{(m+1)c_1^2}{\alpha+1} (t-t_0)^2 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq (m+1)c_1^2 (t-t_0)^2 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\
&\|G^2(x) - G^2(y)\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq (m+1)^2 c_1^2 (t-t_0)^2 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}.
\end{aligned}$$

Здесь  $\mathcal{B}(\alpha, \beta)$  – бета-функция Эйлера. Продолжая аналогичным образом, получим

$$\begin{aligned}
\|D^{\alpha-m+k} G^3(x)(t) - D^{\alpha-m+k} G^3(y)(t)\|_{\mathcal{Z}} &\leq (m+1)^2 c_1^3 \int_{t_0}^t (s-t_0)^2 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, s; \mathcal{Z})} ds \leq \\
&\leq \frac{(m+1)^2 c_1^3}{3} (t-t_0)^3 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\
\|(t-t_0)^{m-\alpha} (G^3(x)(t) - G^3(y)(t))\|_{\mathcal{Z}} &\leq LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-\alpha} \int_{t_0}^t (t-s)^{\alpha-1} \|G^2(x) - G^2(y)\|_{C_\alpha(t_0, s; \mathcal{Z})} ds \leq \\
&\leq (m+1)^2 c_1^2 LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-\alpha} \int_0^{t-t_0} \tau^{\alpha-1} (t-t_0-\tau)^2 d\tau \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \\
&\leq (m+1)^2 c_1^2 LC_{1-\alpha} e^{a(T-t_0)} T_1^{m-1} (t-t_0)^3 \mathcal{B}(\alpha, 3) \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \\
&\leq \frac{(m+1)^2 c_1^3}{(\alpha+1)(\alpha+2)} (t-t_0)^3 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \frac{(m+1)^2 c_1^3 (t-t_0)^3}{2} \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\
\|G^3(x) - G^3(y)\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} &\leq \frac{(m+1)^3 c_1^3 (t-t_0)^3}{2} \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\
\|D^{\alpha-m+k} G^4(x)(t) - D^{\alpha-m+k} G^4(y)(t)\|_{\mathcal{Z}} &\leq \frac{(m+1)^3 c_1^4}{2 \cdot 4} (t-t_0)^4 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\
\|(t-t_0)^{m-\alpha} (G^4(x)(t) - G^4(y)(t))\|_{\mathcal{Z}} &\leq \\
&\leq \frac{(m+1)^3 c_1^4}{(\alpha+1)(\alpha+2)(\alpha+3)} (t-t_0)^4 \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \frac{(m+1)^3 c_1^4 (t-t_0)^4}{3!} \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}, \\
\|G^4(x) - G^4(y)\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} &\leq \frac{(m+1)^4 c_1^4 (t-t_0)^4}{3!} \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})},
\end{aligned}$$

и т. д. Следовательно, для всех  $t \in [t_0, T]$ ,  $j \in \mathbb{N}$ ,  $x, y \in C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$  выполняется оценка

$$\|G^j(x) - G^j(y)\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})} \leq \frac{(m+1)^j c_1^j T_1^j}{(j-1)!} \|x-y\|_{C_\alpha(t_0, t; \mathcal{Z})}.$$

Отсюда следует, что при достаточно большом значении  $j \in \mathbb{N}$   $G^j$  является оператором сжатия и поэтому существует его единственная неподвижная точка  $z \in C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$ , которая также является единственной неподвижной точкой оператора  $G$  в пространстве  $C_{\alpha, \mu^*}(t_0, T; \mathcal{Z})$ . Согласно лемме 3.6,  $z$  – решение задачи (7), (8) на отрезке  $[t_0, T]$ . Его единственность следует из единственности неподвижной точки.

**Замечание 4.1.** В данном и предыдущем параграфах квазилинейные уравнения исследованы с использованием результата теоремы 2.1 о неоднородном линейном уравнении. Аналогичное исследование на основе теоремы 2.2 планируется провести авторами в ближайшее время.

**5. Уравнения с многочленами от самосопряженного оператора.** Пусть  $\varrho, \varsigma, d, r \in \mathbb{N}$ ,  $P_\varrho(\lambda) = \sum_{i=0}^{\varrho} c_i \lambda^i$ ,  $Q_\varsigma(\lambda) = \sum_{j=0}^{\varsigma} d_j \lambda^j$ ,  $c_i, d_j \in \mathbb{R}$ ,  $i = 0, 1, \dots, \varrho$ ,  $j = 0, 1, \dots, \varsigma$ ,  $c_\varrho \neq 0$ ,  $d_\varsigma \neq 0$ ,  $\varrho < \varsigma$ . Рассмотрим ограниченную область  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  с гладкой границей  $\partial\Omega$ , операторный пучок  $\Lambda, B_1, B_2, \dots, B_r$  предполагается регулярно эллиптическим [21], где

$$(\Lambda y)(s) = \sum_{|q| \leq 2r} \frac{a_q(s) \partial^{|q|} y(s)}{\partial^{q_1} s_1 \partial^{q_2} s_2 \dots \partial^{q_d} s_d}, \quad a_q \in C^\infty(\overline{\Omega}),$$

$$(B_l y)(s) = \sum_{|q| \leq r_l} \frac{b_{lq}(s) \partial^{|q|} y(s)}{\partial^{q_1} s_1 \partial^{q_2} s_2 \dots \partial^{q_d} s_d}, \quad b_{lq} \in C^\infty(\partial\Omega), \quad l = 1, 2, \dots, r,$$

$q = (q_1, q_2, \dots, q_d) \in \mathbb{N}_0^d$ ,  $|q| = q_1 + q_2 + \dots + q_d$ .

Определим оператор  $\Lambda_1 \in Cl(L_2(\Omega))$  равенством  $\Lambda_1 y = \Lambda y$  с областью определения

$$D_{\Lambda_1} = H_{\{B_l\}}^{2r}(\Omega) := \{y \in H^{2r}(\Omega) : B_l y(s) = 0, \quad l = 1, 2, \dots, r, \quad s \in \Omega\}.$$

Пусть  $\Lambda_1$  является самосопряженным оператором с ограниченным справа спектром, который в таком случае является вещественным, дискретным и сгущается только на  $-\infty$ . Пусть  $0 \notin \sigma(\Lambda_1)$ ,  $\{\varphi_k : k \in \mathbb{N}\}$  является ортонормированной в  $L_2(\Omega)$  системой собственных функций оператора  $\Lambda_1$ , занумерованной в порядке неубывания соответствующих собственных значений  $\{\lambda_k : k \in \mathbb{N}\}$  с учетом их кратности.

Для  $\alpha \in (1, 2)$  определим дефект  $\mu^* \in \{0, 1, 2\}$  и рассмотрим уравнение при  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_q < \alpha - 1$ ,  $n_i - 1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - 2$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ ,

$$D_t^\alpha P_\varrho(\Lambda)v(s, t) = Q_\zeta(\Lambda)v(s, t) + F(s, D^{\alpha-m-\rho}v(t), \dots, D^{\alpha-1}v(t), D^{\gamma_1}v(s, t), D^{\gamma_2}v(s, t), \dots, D^{\gamma_q}v(s, t)) \quad (s, t) \in \Omega \times (t_0, T), \quad (15)$$

с начальными условиями, которые при  $\mu^* = 0$  имеют вид

$$D_t^{\alpha-2+k}v(s, 0) = v_k(s), \quad s \in \Omega, \quad k = 0, 1, \quad (16)$$

при  $\mu^* = 1$  –

$$D_t^{\alpha-2}v(s, 0) = 0, \quad D_t^{\alpha-1}v(s, 0) = v_1(s), \quad s \in \Omega, \quad (17)$$

при  $\mu^* = 2$  –

$$D_t^{\alpha-2+k}v(s, 0) = 0, \quad s \in \Omega, \quad k = 0, 1, \quad (18)$$

а также краевыми условиями

$$B_l \Lambda^k v(s, t) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \zeta - 1, \quad l = 1, 2, \dots, r, \quad (s, t) \in \partial\Omega \times (t_0, T), \quad (19)$$

где  $v_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  заданы, функция  $v : \Omega \times (t_0, T) \rightarrow \mathbb{R}$  неизвестна. Здесь и далее  $D_t^\alpha$  – оператор дробной производной Римана – Лиувилля по переменной  $t$ .

Пусть  $r_0 \in \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{Z} = \{y \in H^{2r_0+r_0}(\Omega) : B_l \Lambda^k y(s) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \varrho - 1, \quad l = 1, 2, \dots, r, \quad s \in \partial\Omega\}$  и оператор  $P_\varrho(\Lambda_1) : \mathcal{Z} \rightarrow H^r(\Omega)$  непрерывно обратим, что выполняется, если и только если множество нулей многочлена  $P_\varrho(\lambda)$  не пересекается со спектром  $\sigma(\Lambda_1)$  оператора  $\Lambda_1$ . Тогда определим оператор  $Ay := [P_\varrho(\Lambda_1)]^{-1}Q_\zeta(\Lambda)y$  с областью определения  $D_A = \{y \in H^{2r_0+r_0}(\Omega) : B_l \Lambda^k y(s) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \zeta - 1, \quad l = 1, \dots, r, \quad s \in \partial\Omega\}$ .

**Теорема 5.1.** Пусть  $\zeta > \varrho$ ,  $(-1)^{\zeta-\varrho}(d_\zeta/c_\varrho) < 0$ , спектр  $\sigma(\Lambda_1)$  ограничен справа, не содержит нулей полинома  $P_\varrho(\lambda)$ ,  $0 \notin \sigma(\Lambda_1)$ , оператор  $Az := [P_\varrho(\Lambda_1)]^{-1}Q_\zeta(\Lambda)z$  с областью определения  $D_A = \{y \in H^{2r_0+r_0}(\Omega) : B_l \Lambda^k y(s) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \zeta - 1, \quad l = 1, \dots, r, \quad s \in \partial\Omega\}$  действует в пространстве  $\mathcal{Z} = \{z \in H^{2r_0+r_0}(\Omega) : B_l \Lambda^k z(s) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, \varrho - 1, \quad l = 1, 2, \dots, r, \quad s \in \partial\Omega\}$ . Тогда при  $\alpha \in [1, 2)$  существуют такие  $\theta_0 \in (\pi/2, \pi)$ ,  $a_0 \geq 0$ , что  $A \in \mathcal{A}_\alpha(\theta_0, a_0)$ . Если, кроме того,

$$\max_{k \in \mathbb{N}} \frac{Q_\zeta(\lambda_k)}{P_\varrho(\lambda_k)} < 1, \quad (20)$$

то  $A \in \mathcal{A}_\alpha(\theta_0, a_0)$  при  $\alpha \in (0, 1)$ . В обоих случаях  $\sigma(A) = \{\mu \in \mathbb{C} : \mu = Q_\zeta(\lambda_k)/P_\varrho(\lambda_k)\}$ .

Доказательство для  $r_0 = 0$  проведено в [10]. В случае  $r_0 \in \mathbb{N}$  его можно повторить дословно.

**Теорема 5.2.** Пусть  $\alpha \in (1, 2)$ ,  $\gamma_1 < \gamma_2 < \dots < \gamma_q < \alpha - 1$ ,  $n_i - 1 < \gamma_i \leq n_i \in \mathbb{Z}$ ,  $\gamma_i - n_i \neq \alpha - 2$ ,  $i = 1, 2, \dots, q$ ,  $\varrho < \zeta \leq 2\varrho$ ,  $4r_0 + 2r_0 > d$ ,  $(-1)^{\zeta-\varrho}(d_\zeta/c_\varrho) < 0$ , спектр  $\sigma(\Lambda_1)$  ограничен справа, не содержит нулей многочлена  $P_\varrho(\lambda)$ ,  $0 \notin \sigma(\Lambda_1)$ ,  $v_k \in D_A$  при  $k = 0, 1$ ,  $F \in C^\infty(\Omega \times \mathbb{R}^{\rho+m+q}; \mathbb{R})$ . Тогда задача (15), (16), (19) (или (15), (17), (19), или (15), (18), (19)) имеет единственное решение на  $[t_0, T]$ .

**Доказательство.** Нелинейный оператор  $h(y_1, y_2, \dots, y_{\rho+m+q}) := F(\cdot, y_2(\cdot), \dots, y_{\rho+m+q}(\cdot))$  не зависит явно от  $t$  и в силу условия  $d < 4r_0 + 2r_0$ , по предложению 1 из [22, дополнение Б] получим включение  $h \in C^\infty((H^{2r_0+r_0}(\Omega))^{\rho+m+q}; H^{2r_0+r_0}(\Omega))$ . При редукции исследуемой начально-краевой задачи к (7), (8) получим  $B(y_1, y_2, \dots, y_{\rho+m+q}) = [P_\varrho(\Lambda_1)]^{-1}h(y_1, y_2, \dots, y_{\rho+m+q}) \in \mathcal{Z}$ , так как  $h(y_1, y_2, \dots, y_{\rho+m+q}) \in H^r(\Omega)$ . Поэтому выполняется включение  $B \in C^\infty(\mathcal{Z}^{\rho+m+q}; \mathcal{Z})$ . Кроме того,

$$\begin{aligned} & \|AB(x_1, \dots, x_{\rho+m+q}) - AB(y_1, \dots, y_{\rho+m+q})\|_{\mathcal{Z}} = \\ & = \|[P_\varrho(\Lambda_1)]^{-1}Q_\zeta(\Lambda_1)[P_\varrho(\Lambda_1)]^{-1}(h(x_1, \dots, x_{\rho+m+q}) - h(y_1, \dots, y_{\rho+m+q}))\|_{\mathcal{Z}} \leq \\ & \leq C\|h'\|_{\mathcal{L}(\mathcal{Z}^{\rho+m+q}; \mathcal{Z})} \sum_{j=1}^{\rho+m+q} \|x_j - y_j\|_{\mathcal{Z}}, \end{aligned}$$

так как  $\zeta \leq 2\rho$ . Здесь  $h'$  — производная Фреше отображения  $h : \mathcal{Z}^{\rho+m+q} \rightarrow \mathcal{Z}$ . Таким образом, по теореме 4.1 и теореме 5.1 существует единственное решение начально-краевой задачи на  $[t_0, T]$ .

**Замечание 5.1.** При  $\alpha \in (0, 1)$  аналогичный теореме 5.2 результат справедлив при дополнительном условии (20).

### Список литературы

1. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск: Наука и техника; 1987. 688 с.
2. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. Amsterdam, Boston, Heidelberg: Elsevier Science Publishing; 2006. 541 p.
3. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. М.: Физматлит; 2003. 272 с.
4. Prüss J. Evolutionary integral equations and applications. Basel: Springer; 1993. 366 p.
5. Bazhlekova E.G. Subordination principle for fractional evolution equations. *Fractional Calculus & Applied Analysis*. 2000;3(3):213–230.
6. Bazhlekova E.G. Subordination in a class of generalized time-fractional diffusion-wave equations. *Fractional Calculus & Applied Analysis*. 2018;21(4):869–900.
7. Глушак А.В. О задаче типа Коши для абстрактного дифференциального уравнения с дробной производной. *Вестник Воронежского государственного университета. Серия Физика, математика*. 2001;2:74–77.
8. Глушак А.В., Манаенкова Т.А. Прямая и обратная задачи для абстрактного дифференциального уравнения, содержащего дробные производные Адамара. *Дифференциальные уравнения*. 2011;(47)9:1294–1304.
9. Bajlekova E.G. Fractional Evolution Equations in Banach Spaces. PhD thesis. Eindhoven: Eindhoven University of Technology; 2001. 107 p.
10. Fedorov V.E., Romanova E.A. Inhomogeneous fractional evolutionary equation in the sectorial. *Journal of Mathematical Sciences*. 2020;250(3):819–829.
11. Fedorov V.E., Avilovich A.S., Borel L.V. Initial Problems for Semilinear Degenerate Evolution Equations of Fractional Order in the Sectorial Case. *Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems. NABVP 2018, Santiago de Compostela, Spain, September 4–7*. Ed. by I.Area, A.Cabada, J.A.Cid etc. *Springer Proceedings in Mathematics and Statistics*. 2019;292:41–62.
12. Fedorov V.E., Zakharova T.A. Nonlocal solvability of quasilinear degenerate equations with Gerasimov – Caputo derivatives. *Lobachevskii Journal of Mathematics*. 2023;44(2):595–606.
13. Fedorov V.E., Kostic M., Zakharova T.A. Quasilinear fractional order equations and fractional powers of sectorial operators. *Fractal and Fractional*. 2023;7(5)385.
14. Федоров В.Е., Авилевич А.С. Задача типа Коши для вырожденного уравнения с производной Римана — Лиувилля в секториальном случае. *Сибирский математический журнал*. 2019;60(2):461–477.
15. Авилевич А.С., Гордиевских Д.М., Федоров В.Е. Вопросы однозначной разрешимости и приближённой управляемости для линейных уравнений дробного порядка с гёльдеровской правой частью. *Челябинский физико-математический журнал*. 2020;(5)1:5–21.
16. Fedorov V.E., Avilovich A.S. Semilinear fractional-order evolution equations of Sobolev type in the sectorial case. *Complex Variables and Elliptic Equations*. 2021;66(6–7):1108–1121.
17. Fedorov V.E., Turov M.M. Sectorial tuples of operators and quasilinear fractional equations with multi-term linear part. *Lobachevskii Journal of Mathematics*. 2022;(43)6:1502–1512.
18. Федоров В.Е., Туров М.М. Дефект задачи типа Коши для линейных уравнений с несколькими производными Римана – Лиувилля. *Сибирский математический журнал*. 2021;62(5):1143–1162.
19. Туров М.М. Квазилинейные уравнения с несколькими производными Римана – Лиувилля произвольных порядков. *Челябинский физико-математический журнал*. 2022;(7)4:434–446.
20. Fedorov V.E., Turov M.M.. Multi-term equations with Riemann – Liouville derivatives and Hölder type function spaces. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*. 2023;29:42.
21. Трибель Х. Теория интерполяции. Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. М.: Мир; 1980. 664 с.
22. Хэссард Б., Казаринов Н., Вэн И. Теория и приложения бифуркации рождения цикла. М.: Мир; 1985. 280 с.

### References

1. Samko SG, Kilbas AA, Marichev OI. Fractional Integrals and Derivatives. Theory and applications, Yverdon, Gordon and Breach Publ.; 1993. 976 p. (in Russian)
2. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. Amsterdam, Boston, Heidelberg: Elsevier Science Publishing; 2006. 541 p.
3. Nakhushiev AM. Fractional Calculus and its Applications. Moscow: Fizmatlit; 2003. 272 p. (in Russian)

4. Prüss J. Evolutionary integral equations and applications. Basel: Springer; 1993. 366 p.
5. Bazhlekova E.G. Subordination principle for fractional evolution equations. *Fractional Calculus & Applied Analysis*. 2000;3(3):213–230.
6. Bazhlekova E.G. Subordination in a class of generalized time-fractional diffusion-wave equations. *Fractional Calculus & Applied Analysis*. 2018;21(4):869–900.
7. Glushak AV. On the cauchy type problem for an abstract differential equation with fractional derivative. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Fizika, matematika*. 2001;2:74–77. (in Russian)
8. Glushak AV, Manaenkova TA. Direct and inverse problems for an abstract differential equation containing Hadamard fractional derivatives. *Differential Equations*. 2011;(47)9:1294–1304. (in Russian)
9. Bajlekova E.G. Fractional Evolution Equations in Banach Spaces. PhD thesis. Eindhoven: Eindhoven University of Technology; 2001. 107 p.
10. Fedorov V.E., Romanova E.A. Inhomogeneous fractional evolutionary equation in the sectorial. *Journal of Mathematical Sciences*. 2020;250(3):819–829.
11. Fedorov V.E., Avilovich A.S., Borel L.V. Initial Problems for Semilinear Degenerate Evolution Equations of Fractional Order in the Sectorial Case. *Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems. NABVP 2018, Santiago de Compostela, Spain, September 4–7*. Ed. by I.Area, A.Cabada, J.A.Cid etc. *Springer Proceedings in Mathematics and Statistics*. 2019;292:41–62.
12. Fedorov V.E., Zakharova T.A. Nonlocal solvability of quasilinear degenerate equations with Gerasimov – Caputo derivatives. *Lobachevskii Journal of Mathematics*. 2023;44(2):595–606.
13. Fedorov V.E., Kostic M., Zakharova T.A. Quasilinear fractional order equations and fractional powers of sectorial operators. *Fractal and Fractional*. 2023;7(5)385.
14. Fedorov VE, Avilovich AS. A Cauchy type problem for a degenerate equation with the Riemann – Liouville derivative in the sectorial case. *Siberian Mathematical Journal*. 2019; (60)2:359–372. (in Russian)
15. Avilovich AS, Gordievskikh DM, Fedorov VE. Issues of unique solvability and approximate controllability for linear fractional order equations with a Hölderian right-hand side. *Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal*. 2020;(5)1:5–21. (in Russian)
16. Fedorov V.E., Avilovich A.S. Semilinear fractional-order evolution equations of Sobolev type in the sectorial case. *Complex Variables and Elliptic Equations*. 2021;66(6–7):1108–1121.
17. Fedorov V.E., Turov M.M. Sectorial tuples of operators and quasilinear fractional equations with multi-term linear part. *Lobachevskii Journal of Mathematics*. 2022;(43)6:1502–1512.
18. Fedorov VE, Turov MM. The defect of a Cauchy type problem for linear equations with several Riemann – Liouville derivatives. *Siberian Mathematical Journal*. 2021; (62)5:925–942. (in Russian)
19. Turov MM. Quasilinear multi-term equations with Riemann – Liouville derivatives of arbitrary orders. *Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal*. 2022;(7)4:434–446. (in Russian)
20. Fedorov V.E., Turov M.M.. Multi-term equations with Riemann – Liouville derivatives and Hölder type function spaces. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*. 2023;29:42.
21. Triebel H. Interpolation Theory. Function Spaces. Differential Operators. Amsterdam: North-Holland Publ.; 1978. 528 p.
22. Hassard BD, Kazarinoff ND, Wan Y-H. Theory and Applications of Hopf Bifurcation. Cambridge: Cambridge University Press; 1981. 311 p.

**Конфликт интересов:** о потенциальном конфликте интересов не сообщалось.

**Conflict of interest:** no potential conflict of interest related to this article was reported.

Поступила в редакцию 18.09.2024

Received September 18, 2024

Поступила после рецензирования 01.11.2024

Revised November 1, 2024

Принята к публикации 05.11.2024

Accepted November 5, 2024

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Федоров Владимир Евгеньевич** – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математического анализа, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия

**Авилевич Анна Сергеевна** – кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры вычислительной механики и информационных технологий, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**Vladimir E. Fedorov** – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of Mathematical Analysis Department, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

**Anna S. Avilovich** – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Computational Mechanics and Information Technology, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

[К содержанию](#)