

О ФРЕДГОЛЬМОВОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ НЕЙМАНА

Б. Д. Кошанов, А. Д. Кунтуарова

(Статья представлена членом редакционной коллегии А. П. Солдатовым)

Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Алматы, 050010, Казахстан
Институт математики и математического моделирования,
Алматы, 050010, Казахстан

E-mail: koshanov@list.ru, araika.14.89@mail.ru

Аннотация. Для эллиптического уравнения $2l$ -го порядка с постоянными вещественными коэффициентами рассмотрена краевая задача с нормальными производными $(k_j - 1)$ -го порядка, $j = 1, \dots, l$, где $1 \leq k_1 < \dots < k_l \leq 2l$. При $k_j = j$ она переходит в задачу Дирихле, а при $k_j = j + 1$ – задачу Неймана. В данной статье получены условие фредгольмовой разрешимости этой задачи в пространстве $C^{2l, \mu}(\bar{D})$ и доказана эквивалентность условию Шапиро – Лопатинского с условием фредгольмовости обобщенной задачи Неймана.

Ключевые слова: эллиптические уравнения высокого порядка, обобщенная задача Неймана, фредгольмова разрешимость задачи, нормальные производные на границе.

Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта AP 09559378 Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Для цитирования: Кошанов Б. Д., Кунтуарова А. Д. 2021. О фредгольмовой разрешимости обобщенной задачи Неймана. Прикладная математика & Физика. 53(1): 31–39. DOI 10.52575/2687-0959-2021-53-1-31-39.

ON THE FREDHOLM SOLVABILITY OF THE GENERALIZED NEUMANN PROBLEM

B. Koshanov, A. Kuntuarova

(Article submitted by a member of the editorial board A. P. Soldatov)

Abay Kazakh national pedagogical university,
Almaty, 050010, Kazakhstan
Institute of Mathematics and Mathematical modeling,
Almaty, 050010, Kazakhstan

E-mail: koshanov@list.ru, araika.14.89@mail.ru

Received February, 27, 2020

Abstract. For the elliptic equation of $2l$ -th order with of constant real coefficients we consider boundary value problem of the normal derivatives $(k_j - 1)$ order, $j = 1, \dots, l$, where $1 \leq k_1 < \dots < k_l \leq 2l$. When $k_j = j$ it moves into the Dirichlet problem, and when $k_j = j + 1$ it moves into the Neumann problem. In this paper, we obtain a condition for the Fredholm solvability of this problem in the space $C^{2l, \mu}(\bar{D})$ and prove the equivalence of the Shapiro – Lopatinskii condition with the Fredholm condition for the generalized Neumann problem.

Key words: higher order elliptic equations, generalized Neumann problem, Fredholm solvability of the problem, normal derivatives on the boundary

Acknowledgements: The work is supported by the Grant AP 09559378 Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

For citation: Koshanov B. D., Kuntuarova A. D. 2021. On the Fredholm solvability of the generalized Neumann problem. Applied Mathematics & Physics. 53(1): 31–39 (in Russian). DOI 10.52575/2687-0959-2021-53-1-31-39.

1. Введение. Методы комплексного анализа составляют классическое направление в исследовании эллиптических уравнений и уравнений смешанного типа на плоскости и в настоящее время получены фундаментальные результаты. В начале 60-х годов прошлого столетия для эллиптических уравнений и систем был развит новый теоретико-функциональный подход, основанный на использовании функций, аналитических по Дуглису [14, 19]. В работах [19, 12] выяснилось, что в теории эллиптических уравнений и систем важную роль играют функции, аналитические по Дуглису. Эти функции являются решениями эллиптической системы первого порядка, обобщающей классическую систему Коши-Римана. В работах [16, 13] этот подход уже был успешно применен к задачам плоской теории упругости

(включая общий анизотропный случай). Однако для областей с кусочно-гладкой границей и уравнений с непрерывными коэффициентами и, особенно, для задач с нелокальными краевыми условиями этот подход требует своего дальнейшего развития. Несомненный интерес представляет также описание условия фредгольмовости и вычисление формулы индекса для так называемой обобщенной задачи Неймана для эллиптических уравнений высокого порядка [6, 7]. В этой задаче на границе области задается некоторый набор нормальных производных различного порядка, число которых равно половине порядка эллиптического уравнения. В 1988 году [3] предложил краевую задачу для полигармонического уравнения, которая заключается в задании последовательных нормальных производных решения на границе области, начиная с некоторого номера k . При $k = 0$ она соответствует классической задаче Дирихле, а при $k = 1$ – задаче Неймана. В общем случае при $k \geq 2$ ее естественно назвать обобщенной задачей Неймана. Представляет интерес случай, когда порядки этих производных задаются произвольно по возрастанию.

2. Постановка задачи и основные результаты. Пусть D – ограниченная односвязная область с гладкой границей Γ . В этой области для общего эллиптического уравнения $2l$ -го порядка

$$\sum_{r=0}^{2l} a_r \frac{\partial^{2l} u}{\partial x^{2l-r} \partial y^r} + \sum_{0 \leq r \leq k \leq 2l-1} a_{rk}(x) \frac{\partial^k u}{\partial x^{k-r} \partial y^r} = F \quad (1)$$

рассматривается краевая задача

$$\frac{\partial^{k_j-1} u}{\partial n^{k_j-1}} \Big|_{\Gamma} = f_j, \quad j = 1, \dots, l, \quad (2)$$

где $a_r \in \mathbb{R}$, $a_{kr} \in C^\mu(\bar{D})$, $0 < \mu < 1$, $n = n_1 + in_2$ – единичная внешняя нормаль к границе Γ , и натуральные $k_j : 1 \leq k_1 < \dots < k_l \leq 2l$.

Для полигармонического уравнения последняя задача была изучена [3]. Другой вариант задачи Неймана, основанный на вариационном принципе, был ранее предложен [5]. При $a_{kr} = 0$, $F = 0$ задача (1),(2) была исследована в работе [4]. При $a_{kr} \neq 0$, $F \neq 0$ задача (1),(2) подробно исследовалась в работе [6] в пространстве $C_a^{2l-1, \mu}(\bar{D})$ и в [7] в пространстве $C^{2l, \mu}(\bar{D})$, где, в частности, были найдены необходимые и достаточные условия их фредгольмовости. В работе [17] задача (1),(2) была исследована в многосвязной области. При решении таких задач в основном используются теория сингулярных интегральных уравнений на гладких, кусочно-гладких контурах [1, 4]. Работа [8] посвящена исследованию разрешимости краевых задач для неоднородного полигармонического уравнения в многомерном шаре.

Нахождение необходимой и достаточной условия фредгольмовости задачи (1), (2) может быть описано следующим образом. Пусть v_k , $1 \leq k \leq m$, – все различные корни характеристического уравнения $a_0 + a_1 z + \dots + a_{2l} z^{2l} = 0$ в верхней полуплоскости и l_k – кратность k -го корня, так что $l_1 + \dots + l_m = l$.

Введем дробно линейные по z функции

$$\omega(e, z) = \frac{-e_2 + e_1 z}{e_1 + e_2 z}, \quad 1 \leq j \leq l, \quad (3)$$

где зависимость от единичного касательного вектора $e = e_1 + ie_2$ к контуру Γ указана явно. Для определенности вектор e ориентируем положительно по отношению к области D , т. е. D лежит слева от этого вектора. В частности,

$$n_1 = e_2, \quad n_2 = -e_1. \quad (4)$$

Исходя из l -вектор-функции $g(\zeta) = (g_1(\zeta), \dots, g_l(\zeta))$, аналитической в окрестности точек ζ_1, \dots, ζ_m , введем блочную $l \times l$ - матрицу

$$W_g(\zeta_1, \dots, \zeta_m) = (W_g(\zeta_1), \dots, W_g(\zeta_m)), \quad (5)$$

где матрица $W_g(\zeta_k) \in \mathbb{C}^{l \times l_k}$ составлена из векторов-столбцов

$$g(\zeta_k), g'(\zeta_k), \dots, \frac{1}{(l_k - 1)!} g^{(l_k-1)}(\zeta_k).$$

В качестве g ниже используется вектор

$$g_j(\zeta) = \zeta^{k_j-1}, \quad 1 \leq j \leq l. \quad (6)$$

В этих обозначениях [6] задача (1), (2) фредгольмова тогда и только тогда, когда

$$\det W_g[\omega(e, v_1), \dots, \omega(e, v_m)] \neq 0, \quad e \in \mathbb{T}, \quad (7)$$

где \mathbb{T} – означает единичную окружность. Это условие зависит только от набора k_1, k_2, \dots, k_l . Следовательно, при фиксированных k_j и при выполнении условия (7) задача (1), (2) фредгольмова в любой области.

С точки зрения общей эллиптической теории [11] задача (1),(2) Фредгольма в пространстве $C^{2l,\mu}(\bar{D})$ тогда и только тогда, когда ее краевые условия удовлетворяют так называемому условию дополнителности (или условию Шапиро – Лопатинского) [9]. В этом случае говорят также [18], что краевые условия (2) накрывают дифференциальный оператор

$$L = \sum_{r=0}^{2l} a_r \frac{\partial^{2l}}{\partial x^{2l-r} \partial y^r},$$

отвечающий главной части (1). Указанное условие состоит в следующем: исходя из фиксированной точки $t \in \Gamma$, дифференцирования по x и y в выражениях операторов L и B_j заменим на, соответственно, $e_1(t) + zn_1(t)$ и $e_2(t) + zn_2(t)$. В результате получим многочлены

$$L(n, z) = \sum_{r=0}^{2l} a_r (e_1 + zn_1)^{2l-r} (e_2 + zn_2)^r$$

и

$$B_j(z) = [n_1(e_1 + zn_1) + n_2(e_2 + zn_2)]^{k_j-1} = z^{k_j-1}, \quad 1 \leq j \leq l.$$

С учетом (4) в обозначениях (3) многочлен $L(n, z)$ можем записать в виде

$$L(n, z) = (e_1 + zn_1)^{2l} \sum_{r=0}^{2l} a_r [-\omega(z)]^r,$$

так что $L(n, \zeta) = 0$ равносильно

$$-\omega(\zeta) = \nu, \tag{8}$$

где ν – произвольный корень характеристического уравнения. При этом их соответствующие кратности совпадают. Очевидно, преобразование (3) переводит верхнюю полуплоскость на себя, так что аналогичным свойством обладает и преобразование $\zeta \rightarrow -\omega(\zeta)$. В частности, многочлен l -степени

$$L^+(z) = (z - \zeta_1)^{l_1} \dots (z - \zeta_m)^{l_m}, \quad -\omega(\zeta_j) = \bar{\nu}_j, \tag{9}$$

образован корнями уравнения $L(n, \zeta) = 0$, лежащими в верхней полуплоскости.

В принятых обозначениях условие дополнителности заключается в линейной независимости многочленов $B_j(z)$, $1 \leq j \leq l$, по модулю многочлена $L^+(z)$. Таким образом, это условие должно быть эквивалентно условию (6), полученному другим способом. Этот факт легко установить непосредственно.

Теорема 1. *Условие (7) выполнено тогда и только тогда, когда многочлены $B_j(z) = z^{k_j-1}$, $1 \leq j \leq l$, линейно независимы по модулю многочлена $L^+(z)$.*

Доказательство. Предположим, что эти многочлены линейно зависимы по модулю $L^+(z)$, т. е. найдется их нетривиальная линейная комбинация $B = \alpha_1 B_1 + \dots + \alpha_l B_l$, кратная L^+ . В обозначениях (6) многочлен $B_j = g_j$, так что этот факт можем записать в виде

$$B(z) = \sum_{j=1}^l \alpha_j z^{k_j-1} = Q(z)L^+(z),$$

с некоторым многочленом Q . В соответствии с (9) это соотношение означает, что многочлен B в точках ζ_k имеет нуль порядка l_k или, что равносильно,

$$\sum_{j=1}^l \alpha_j g_j^{(s)}(\zeta_k) = 0, \quad 0 \leq s \leq l_k - 1, \quad 1 \leq k \leq m. \tag{10}$$

Эти равенства представляют собой однородную систему l уравнений относительно $\alpha_1, \dots, \alpha_l$. Из определения (5) видно, что матрица этой системы совпадает с матрицей, транспонированной к $W_g(\zeta_1, \dots, \zeta_m)$. Поэтому ненулевое решение системы (10) возможно тогда и только тогда, когда

$$\det W_g(\zeta_1, \dots, \zeta_m) = 0. \tag{11}$$

Согласно определению (3) равенство (8) равносильно $\bar{\zeta}_j = \omega(\nu_j)$, поэтому равенство (11) можем выразить в форме обращения в нуль определителя в левой части (7). Итак, нарушение условия дополнителности равносильно нарушению условия (7), что завершает доказательство теоремы.

Заметим, что условие (7) не изменится, если от вектора g перейти к вектору q , определяемому соотношением $g(\zeta) = \zeta^{k_1-1}q(\zeta)$, или, в явном виде,

$$q(\zeta) = (1, \zeta^{s_1}, \dots, \zeta^{s_{l-1}}), \quad s_j = k_{j+1} - k_1. \quad (12)$$

В самом деле, как отмечено в [6, 10], определитель матриц W_g и W_q отличаются друг от друга ненулевым множителем.

Условию (7) можно придать другой вид, более удобный для использования. С этой целью рассмотрим определитель матрицы $W_q(\zeta_1, \dots, \zeta_m)$. Он представляет собой многочлен переменных ζ_j , который в терминах мультииндексов $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ и β можно записать в форме

$$\det W_q(\zeta_1, \dots, \zeta_m) = \sum_{\alpha \leq \beta} c_\alpha \zeta^\alpha, \quad (13)$$

где запись $\alpha \leq \beta$ означает неравенство $\alpha_j \leq \beta_j$ для всех j и использовано обычное обозначение $\zeta^\alpha = \zeta_1^{\alpha_1} \dots \zeta_m^{\alpha_m}$. Введем еще дробно линейные функции

$$\gamma_k(z) = \frac{v_k - z}{1 + v_k z}, \quad 1 \leq k \leq m. \quad (14)$$

Теорема 2. *Задача (1), (2) фредгольмова тогда и только тогда, когда рациональная функция*

$$R(z) = \sum_{\alpha \leq \beta} c_\alpha [\gamma_1(z)]^{\alpha_1} \dots [\gamma_m(z)]^{\alpha_m} \quad (15)$$

не имеет вещественных корней на расширенной действительной прямой $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Доказательство. Из сравнения операций (3) и (14) следует, что

$$\det W_g[\omega(e, v_1), \dots, \omega(e, v_m)] = R(e_2/e_1). \quad (16)$$

Функция $\omega(e, v)$ в (3) четна по переменной $e \in \mathbb{T}$ и потому величина

$$\arg \det W_g[\omega(e, v_1), \dots, \omega(e, v_m)] \Big|_{\mathbb{T}} = 2 \arg \det W_q[\omega(e, v_1), \dots, \omega(e, v_m)] \Big|_{\mathbb{T}^+},$$

где \mathbb{T}^+ есть полуокружность в правой полуплоскости. Отображение $e = e_1 + ie_2 \rightarrow t = e_2/e_1$ осуществляет гомеоморфизм этой полуокружности на расширенную вещественную прямую $\overline{\mathbb{R}}$, причем обход ее от точки $e = -i$ к $e = i$ соответствует движению на прямой в положительном направлении. Поэтому в соответствии с (16) условие (7) равносильно тому, что функция R не имеет вещественных корней на расширенной действительной прямой. Теорема доказана.

Рассмотрим подробнее функцию $\gamma(\zeta)$, определяемую (14) с $v = v_k$. Данное преобразование $\gamma_k(z)$ меняет местами точки $\pm i$ и инволютивно:

$$\gamma(\pm i) = \mp i, \quad \gamma[\gamma(\zeta)] \equiv \zeta. \quad (17)$$

Кроме того, при $v_k = i$ имеет место тождество $\gamma_k(\zeta) \equiv i$.

Лемма 1. *При $v \neq i$. Преобразование $\zeta \rightarrow \gamma(\zeta)$ переводит нижнюю полуплоскость на круг*

$$B = \{z : |z|^2 + 1 - 2\rho \operatorname{Im} z < 0\}, \quad \rho = \frac{|v|^2 + 1}{2\operatorname{Im} v}. \quad (18)$$

Этот круг имеет центром точку $i\rho$ радиус $r = \sqrt{\rho^2 - 1}$, целиком лежит в верхней полуплоскости, содержит точку $z = i$ и инвариантен относительно инволюции $z \mapsto z' = -1/z$.

Кроме того, точки v и $v' = -1/v$ лежат на его граничной окружности $L = \partial B$.

Доказательство. В силу (14) имеем

$$\operatorname{Im}[\gamma(\zeta)] = \frac{(1 + |\zeta|^2)\operatorname{Im} v - (1 + |v|^2)\operatorname{Im} \zeta}{|1 + v\zeta|^2}.$$

Отсюда образом нижней полуплоскости является круг B , который целиком лежит в верхней полуплоскости и содержит точку $z = i$. В силу принципа симметрии точки $\pm i$ симметричны как относительно прямой \mathbb{R} , так и окружности $L = \partial B$. В частности, центр этой окружности должен лежать на мнимой оси. Обозначая центр и радиус этой окружности, соответственно, $i\rho$ и r , приходим к соотношению $|i - i\rho||i + i\rho| = r^2$, откуда $r^2 = \rho^2 - 1$. Уравнение $|z - i\rho|^2 = r^2$ окружности L можем записать в виде $|z|^2 + 1 - 2\rho \operatorname{Im} z = 0$, что доказывает описание (18) круга B .

Очевидно, что точки $\gamma(0) = v$ и $\gamma(\infty) = -1/v$ лежат на L . В частности, подставляя в это уравнение $z = v$,

приходим к выражению для ρ в (18). То, что окружность L инвариантна относительно преобразования $z \mapsto z' = -1/z$, вытекает непосредственно из ее уравнения. Лемма доказана.

Лемма 1 используется для случая $m = 2$ двух точек v_1, v_2 , которые в соответствии с теоремой 2 [6] без ограничения общности можно считать различными. Пусть их нумерация такова, что $v_1 \neq i$. Тогда в силу (17) преобразование γ_1 переводит круг B на нижнюю полуплоскость, и можно ввести функцию

$$S(z) = R[\gamma_1(z)] = (\det W_g)[z, \delta(z)], \quad \delta(z) = \gamma_2[\gamma_1(z)], \quad (19)$$

аналитическую в круге B . В явном виде имеет место

$$\delta(z) = \frac{1 + \tau z}{\tau - z}, \quad \tau = \frac{1 + v_1 v_2}{v_2 - v_1} \in B. \quad (20)$$

То, что точка τ не принадлежит замкнутому кругу \bar{B} , является следствием леммы 1. В самом деле, $\tau = -1/[\gamma_1(v_2)]$, и по лемме 1 точка $z = \gamma_1(v_2)$ лежит вне \bar{B} , так что это верно и для $\tau = z' = 1/z$.

По отношению к функции S теорема 2 принимает следующую форму.

Теорема 3. Пусть $m = 2$ с $v_2 \neq v_1 \neq i$ и приняты обозначения леммы 1. Тогда фредгольмовость задачи (1), (2) равносильна тому, что функция $S(z)$ не имеет нулей на окружности $L = \partial B$.

Заметим, что, как и R , функция S обращается в нуль в точках $\pm i$. Эта функция особенно упрощается, если $1 + v_1 v_2 = 0$, тогда преобразование δ в (20) представляет собой инволюцию $z \mapsto z' = -1/z$. В этом случае теорема 2 переходит в теорему 3 из работы [6].

3. Применение результатов к общему уравнению четвертого и шестого порядков. Применение теоремы 3 на примере для уравнения (1) четвертого порядка. Поскольку на фредгольмовости задачи младшие члены не оказывают влияния, можно ограничиться главной частью уравнения с $v_2 \neq v_1 \neq i$. Это уравнение может быть записано в виде

$$L_1 L_2 u = 0 \quad (21)$$

с операторами второго порядка

$$L_k = \frac{\partial^2}{\partial y^2} - 2(\operatorname{Re} v_k) \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} + |v_k|^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad k = 1, 2.$$

По отношению к разности $s = k_2 - k_1$, которая в рассматриваемом случае принимает три значения $s = 1, 2, 3$, задача (2) запишется в форме

$$\left. \frac{\partial^i u}{\partial n^i} \right|_{\Gamma} = f_1, \quad \left. \frac{\partial^{i+s} u}{\partial n^{i+s}} \right|_{\Gamma} = f_2, \quad 0 \leq i \leq 3 - s. \quad (22_s)$$

Согласно (5), (13) в рассматриваемом случае матрица W_q принимает вид

$$W_q(z_1, z_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ z_1^s & z_2^s \end{pmatrix}, \quad \det W_q(z_1, z_2) = z_2^s - z_1^s,$$

так что $S(z) = [\delta(z)]^s - z^s$. В явном виде

$$S(z) = \frac{(1 + z^2)P_s(z)}{(\tau - z)^s},$$

где $P_1(z) = 1$, $P_2(z) = -z^2 + 2\tau z + 1$ и

$$P_3(z) = [qz^2 + (1 - q)\tau z + 1][q^2 z^2 + (1 - q^2)\tau z + 1], \quad q = e^{2\pi i/3}. \quad (23)$$

Заметим, что многочлен P_2 отличен от нуля в \bar{B} . В самом деле, пусть $z^2 - 2\tau z - 1 = 0$ для некоторого $z \in \bar{B}$. Так что точка $z' = -1/z$ также принадлежит \bar{B} , то и точка $\tau = (z + z')/2 \in \bar{B}$, что противоречит (20).

Поскольку в рассматриваемом случае $\sum_{i>j} l_i l_j = 3$, то на основании теоремы 2 [6] отсюда получаем следующее заключение.

Заключение 1. При $s \leq 2$ задача (21), (22_s) фредгольмова и её индекс равен нулю, а при $s = 3$ она фредгольмова тогда и только тогда, когда нули многочлена P_3 не лежат на граничной окружности L круга B , определяемого леммой 1 по $v = v_1$.

Как показывает следующая лемма, при подходящем выборе v_1 и v_2 всегда можно добиться того, чтобы один из нулей многочлена P_3 лежал на окружности L .

Лемма 2. Пусть точка $v = v_1$ лежит в верхней полуплоскости и в обозначениях леммы 1

$$\tau = -i\rho - \sqrt{(\rho^2 - 1)/3}. \quad (24)$$

Тогда точка

$$v_2 = \frac{1 + \tau v_1}{\tau - v_1}$$

также лежит в верхней полуплоскости и для этих точек фредгольмовость задачи (21), (22_s) нарушена.

Доказательство. Убедимся прежде всего в том, что точка v_2 лежит в верхней полуплоскости. В самом деле, из определения v_2 видно, что $\tau = -1/\gamma_1(v_2)$. Поэтому, если $\text{Im}v_2 \leq 0$, то в силу леммы 1 точка τ должна принадлежать \bar{B} , что невозможно.

Пусть it_1 и it_2 , $t_2 > t_1$, – это точки пересечения окружности L с мнимой осью. Тогда, согласно (18) справедливы равенства $t_k^2 + 1 - 2\rho t_k = 0$, $k = 1, 2$, и, справедливо,

$$t_1 + t_2 = 2\rho, \quad t_1 t_2 = 1, \quad t_2 - t_1 = 2\sqrt{\rho^2 - 1}. \quad (25)$$

Утверждается, что точка $z = it_2$ является корнем первого сомножителя в (23) и, следовательно, задача (21), (22_s) не является фредгольмовой.

В самом деле, поскольку $1/z = -it_1$, уравнение $e^{2\pi i/3} z^2 - \tau(1 - e^{2\pi i/3})z + 1 = 0$ можем переписать в форме

$$e^{\pi i/3} it_2 - e^{-\pi i/3} it_1 = -i\tau\sqrt{3},$$

что с учетом соотношений (25) равносильно равенству (24).

Для эллиптических уравнений порядков выше четвертого описать явно корни соответствующих многочленов уже затруднительно. Рассмотрим, например, уравнение шестого порядка, т. е. $l = 3$. В соответствии с теоремой 2 достаточно ограничиться рассмотрением двух случаев: (i) все корни попарно различны, т. е. $l_1 = l_2 = l_3 = 1$ и (ii) один из этих корней кратен, например, $l_1 = 1$, $l_2 = 2$. Соответственно этим случаям аналогично (21) имеем уравнения

$$L_1 L_2 L_3 u = f, \quad (26i)$$

$$L_1 L_2^2 u = f, \quad (26ii)$$

соответствующими операторами второго порядка. По отношению к положительным разностям $r = k_2 - k_1$ и $s = k_3 - k_2$, для которых $r + s \leq 5$, задача (2) запишется в форме

$$\left. \frac{\partial^i u}{\partial n^i} \right|_{\Gamma} = f_1, \quad \left. \frac{\partial^{i+s} u}{\partial n^{i+s}} \right|_{\Gamma} = f_2, \quad \left. \frac{\partial^{i+s+1} u}{\partial n^{i+s+1}} \right|_{\Gamma} = f_3, \quad 0 \leq i \leq 5 - r - s. \quad (27_{r,s})$$

В соответствии с этим, вектор (12) следует взять в виде $q = (1, z^r, z^{r+s})$, так что для матрицы W_q в определении (5), имеем выражения

$$(i) W_q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1^r & z_2^r & z_3^r \\ z_1^{r+s} & z_2^{r+s} & z_3^{r+s} \end{pmatrix}, \quad (ii) W_q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ z_1^r & z_2^r & r z_2^{r-1} \\ z_1^{r+s} & z_2^{r+s} & (r+s) z_2^{r+s-1} \end{pmatrix}.$$

В случае (i) определитель матрицы $W_q(z_1, z_2, z_3)$ можем представить в форме

$$-\det W_q = (z_1^r - z_2^r) z_3^{r+s} + (z_1^r - z_3^r) z_2^{r+s} + (z_3^r - z_2^r) z_1^{r+s}.$$

Поэтому для функции (15) имеем равенство

$$-R(z) = \frac{(1+z^2)P(z)}{[(1+v_1 z)(1+v_2 z)(1+v_3 z)]^{r+s}},$$

с некоторым многочленом $P(z)$. Здесь учтено, что при $m \geq 3$ функция $R(z)$ обращается в нуль в точках $z = \pm i$.

4. Заключение. Поскольку $\sum_{i>j} l_i l_j = 3$, то на основании теоремы 3 отсюда получаем следующее заключение.

Заключение 2. Фредгольмовость задачи (26i), (27) равносильно отсутствию вещественных нулей многочлена $P(\zeta)$ на окружности L .

Многочлен P при $r = 1$ согласно

$$\gamma_i(\zeta) - \gamma_j(\zeta) = \frac{(v_i - v_j)(1 + \zeta^2)}{(1 + v_i \zeta)(1 + v_j \zeta)}$$

имеет вид

$$P(z) = \sum_{i,j} (v_i - v_j) [(1 + v_i z)(1 + v_j z)]^s (v_k - z)^{s+1},$$

где штрих у знака суммы означает, что суммирование ведется по циклическим тройкам

$$(i, j, k) = (1, 2, 3); (2, 3, 1); (3, 1, 2).$$

Если дополнительно и $s = 1$, то, как показывает прямая проверка, $P(z) = c(1 + z^2)^2$ с множителем

$$c = \sum' (v_i - v_j)v_k^2 = (v_1 - v_2)v_3^2 + (v_2 - v_3)v_1^2 + (v_3 - v_1)v_2^2.$$

В этом случае индекс задачи равен нулю, что согласуется с теоремой 2.

Обратимся к случаю (ii), где можно считать $v_2 \neq v_1 \neq i$. В этом случае

$$\det W_q = z_2^{r-1} [sz_2^s(z_2^r - z_1^r) - rz_1^r(z_2^s - z_1^s)] = z_1^{r+s-1} z_2^{r-1} (z_2 - z_1) \chi(z_2/z_1),$$

где $(q-1)\chi_{r,s}(q) = sq^s(q^r - 1) - r(q^s - 1)$ с многочленом

$$\chi_{r,s}(q) = \sum_{j=0}^{r+s-1} \alpha_j q^j, \quad \alpha_j = \begin{cases} -r, & 0 \leq j \leq s-1, \\ s, & s \leq j \leq r+s-1, \end{cases}$$

степени $r + s - 1 \leq 4$. В явной форме

$$\begin{aligned} \chi_{1,2}(q) &= -1 + 2q + 2q^2, & \chi_{2,1}(q) &= -2 - 2q + q^2, \\ \chi_{1,3}(q) &= -1 + 3q + 3q^2 + 3q^3, & \chi_{3,1}(q) &= -3 - 3q - 3q^2 + q^3, \\ \chi_{2,3}(q) &= -2 - 2q + 3q^2 + 3q^3 + 3q^4, & \chi_{3,2}(q) &= -3 - 3q - 3q^2 + 2q^3 + 2q^4, \\ \chi_{2,2}(q) &= -2 - 2q + 2q^2 + 2q^3 = 2(q+1)^2(q+1). \end{aligned}$$

Как и в случае $l = 2$, отсюда приходим к следующему выражению для функции $S(z)$ теоремы 3:

$$S(z) = z^{r+s} (1 + z^2) \frac{(1 + az)^{r-1}}{(a - z)^r} P_{r,s}(z), \quad P_{r,s}(z) = [q_j z^2 + (1 - q_j)az + 1],$$

где q_j – корни многочлена $\chi_{r,s}(q)$, взятые с учетом кратности.

Поскольку $\sum_{i>j} l_i l_j = 2$, то на основании теоремы 3 отсюда получаем следующее заключение.

Заключение 3. Фредгольмовость задачи (26ii), (27) равносильно отсутствию нулей многочлена $P_{r,s}$ на окружности L .

Окончательный ответ удастся дать только в случае $r = s = 2$. Для него

$$P_{2,2}(z) = (z^2 - 2\tau z - 1)^2 (z^2 + 1),$$

и, как показано в случае $l = 2$ уравнения четвертого порядка, первый множитель здесь не имеет нулей в замкнутом круге \bar{B} . Поэтому задача (26ii), (27_{2,2}) фредгольмова и ее индекс равен нулю.

Благодарность. Авторы выражают благодарность за постановку задачи и внимание к работе доктору физико-математических наук, профессору Солдатову Александру Павловичу.

Список литературы

1. Абалолова Е. А., Солдатов А. П. 2010. К теории сингулярных интегральных уравнений на гладком контуре. Научные ведомости БелГУ. Серия: Математика. Физика, 18(5): 6–20.
2. Агмон С., Дуглис А., Ниренберг Л. 1962. Оценки вблизи границы решений эллиптических уравнений в частных производных при общих граничных условиях. М.: Наука, 206.
3. Бицадзе А. В. 1988. О некоторых свойствах полигармонических функций. Дифференциальные уравнения, 24(5): 825–831.
4. Ващенко О. В., Солдатов А. П. 2006. Интегральное представление решений обобщенной системы Бельтрами. Научные ведомости БелГУ. Серия: Информатика. Прикладная математика, 21(6): 3–6.
5. Дезин А. А. 1954. Вторая краевая задача для полигармонического уравнения в пространстве. Доклады АН СССР, 96(5): 901–903.
6. Кошанов Б. Д., Солдатов А. П. 2016. Краевая задача с нормальными производными для эллиптического уравнения высшего порядка на плоскости. Дифференциальные уравнения, 52(12): 1594–1609. Doi: 10.1134/S0012266116120077.

7. Кошанов Б. Д., Солдатов А. П. 2018. О разрешимости краевых задач для эллиптического уравнения высокого порядка на плоскости. Вестник Карагандинского университета. Серия: Математика, 91(3): 24–31. Doi: 10.31489/2018M3/24-30.
8. Кошанов Б. Д. 2013. Условия разрешимости краевых задач для неоднородного полигармонического уравнения в шаре. Научные ведомости БелГУ. Серия: Математика. Физика, 11(154): 44–54.
9. Лопатинский Я. Б. 1953. Об одном способе приведения граничных задач для системы дифференциальных уравнений эллиптического типа к регулярным интегральным уравнениям. Украинский математический журнал, 5(2): 123–151.
10. Малахова Н. А., Солдатов А. П. 2008. Об одной краевой задаче для эллиптического уравнения высокого порядка. Дифференциальные уравнения, 44(8): 1111–1118. Doi: 10.1134/S0012266108080089.
11. Назаров С. А., Пламеневский Б. А. 1991. Эллиптические задачи в областях с кусочно гладкой границей. М.: Наука, 336.
12. Солдатов А. П. 1989. Эллиптические системы высокого порядка. Дифференциальные уравнения, 25(1): 136–144.
13. Солдатов А. П. 2017. Об одной краевой задаче для эллиптического уравнения на плоскости в многосвязной области. Владикавказский математический журнал. 19(3): 51–58.
14. Douglis A. A. 1960. On uniqueness in Cauchy problems for elliptic systems of equations. Communications on Pure and Applied Mathematics, 13(4): 593–607.
15. Gilbert R. P. 1969. Function theoretic methods in partial differential equations. New York.: Academic Press, 311.
16. Soldatov A. P. 2014. Generalized potentials of double layer in plane theory of elasticity. Eurasian mathematical journal, 5(4): 78–125.
17. Soldatov A. P. 2018. On the Theory of Anisotropic Flat Elasticity. Journal of Mathematical Sciences, 235(4): 484–535. Doi: 10.1007/s10958-018-4083-7.
18. Schechter M. 1950. General boundary value problems for elliptic partial differential equations. Communications on Pure and Applied Mathematics, 12: 467–480.
19. Yeh R. Z. 1990. Hyperholomorphic functions and higher order partial differentials equations in the plane. Pacific Journal of Mathematics, 142(2): 379–399.

References

1. Abapolova Ye. A., Soldatov A. P. 2010. К теории сингулярных интегральных уравнений на гладком контуре [On the theory of singular integral equations on a smooth contour]. Nauchnyye vedomosti BelGU. Seriya: Matematika. Fizika, 18(5): 6-20 (in Russian).
2. Agmon S., Douglis A., Nirenberg L. 1962. Estimates near the boundary of solutions of elliptic partial differential equations under general boundary conditions. M.: Nauka, 206 (in Russian).
3. Bitsadze A. V. 1988. On some properties of polyharmonic functions. Differential equations, 24(5): 825-831.
4. Vashchenko O. V., Soldatov A. P. 2006. Integral'noye predstavleniye resheniy obobshchennoy sistemy Bel'trami [Integral representation of solutions of the generalized Beltrami system]. Nauchnyye vedomosti BelGU. Seriya: Informatika. Prikladnaya matematika, 21(6): 3-6 (in Russian).
5. Dezin A. A. 1954. Vtoraya krayevaya zadacha dlya poligarmonicheskogo uravneniya v prostranstve [The second boundary value problem for a polyharmonic equation in space]. Doklady AN SSSR, 96(5): 901-903 (in Russian).
6. Koshanov B. D., Soldatov A. P. 2016. Boundary value problem with normal derivatives for a higher order elliptic equation on the plane. Differential Equations, 52(12): 1594-1609. Doi: 10.1134/S0012266116120077.
7. Koshanov B. D., Soldatov A. P. 2018. On the Solvability of the Boundary Value Problems for the Elliptic Equation of High Order on a Plane. Bulletin of the Karaganda University. Mathematics series, 91(3): 24-31. Doi: 10.31489/2018M3/24-30.

8. Koshanov B. D. 2013. Usloviya razreshimosti krayevykh zadach dlya neodnorodnogo poligarmonicheskogo uravneniya v share [Conditions for the solvability of boundary value problems for an inhomogeneous polyharmonic equation in a ball]. Nauchnyye vedomosti BelGU. Seriya: Matematika. Fizika, 11(154): 44-54 (in Russian).
9. Lopatinskiy Ya. B. 1953. Ob odnom sposobe privedeniya ganichnykh zadach dlya sistemy differentsial'nykh uravneniy ellipticheskogo tipa k regulyarnym integral'nym uravneniyam [On one way of reducing ganic problems for a system of differential equations of elliptic type to regular integral equations]. Ukrainskii matematicheskii zhurnal. 5(2): 123-151 (in Russian).
10. Malakhova N. A., Soldatov A. P. 2008. On a boundary value problem for a higher-order elliptic equation. Differential Equations, 44(8): 1111-1118. Doi: 10.1134/S0012266108080089.
11. Nazarov S. A., Plamenevskiy B. A. 1991. Ellipticheskiye zadachi v oblastiakh s kusochno gladkoy granitsey [Elliptic problems in domains with piecewise smooth boundaries]. M.: Nauka, 336 (in Russian).
12. Soldatov A.P. 1989. High order elliptical systems. Differential equations, 25(1): 136-144.
13. Soldatov A. P. 2018. On the Theory of Anisotropic Flat Elasticity. Journal of Mathematical Sciences, 235(4): 484-535. Doi: 10.1007/s10958-018-4083-7.
14. Douglis A. A. 1960. On uniqueness in Cauchy problems for elliptic systems of equations. Communications on Pure and Applied Mathematics, 13(4): 593-607.
15. Gilbert R. P. 1969. Function theoretic methods in partial differential equations. New York.: Academic Press, 311.
16. Soldatov A. P. 2014. Generalized potentials of double layer in plane theory of elasticity. Eurasian mathematical journal, 5(4):78-125.
17. Soldatov A. P. 2017. Ob odnoy krayevoy zadache dlya ellipticheskogo uravneniya na ploskosti v mnogosvyaznoy oblasti [A boundary value problem for an elliptic equation on a plane in a multiply connected domain]. Vladikavkazskiy matematicheskii zhurnal. 19(3): 51-58 (in Russian).
18. Schechter M. 1950. General boundary value problems for elliptic partial differential equations. Communications on Pure and Applied Mathematics, 12: 467-480.
19. Yeh R. Z. 1990. Hyperholomorphic functions and higher order partial differentials equations in the plane. Pacific Journal of Mathematics, 142(2): 379-399.

Получена 27.02.2021

Кошанов Бакытбек Данебекович – доктор физико-математических наук, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая, ГНС Института математики и математического моделирования

 <http://orcid.org/0000-0002-0784-5183>

пр. Достык, 13, Алматы, 050010, Казахстан
ул. Пушкина, 125, Алматы, 050010, Казахстан
E-mail: koshanov@list.ru

Кунтуарова Арай Довлетбаевна – преподаватель Казахского национального педагогического университета имени Абая

 <http://orcid.org/0000-0002-8077-1109>

пр. Достык, 13, Алматы, 050010, Казахстан
E-mail: araika.14.89@mail.ru